

PRINCIPIO ACTIVO	ESPECIALIDAD	CLASIFICACION NIOSH	PRECAUCIONES PREPARACIÓN	PRECAUCIONES DE ADMINISTRACIÓN
ABACAVIR/LAMIVUDINA	ABACAVIR/LAMIVUDINA TEVA 600/300MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELIC EFG	2	No precisa. Si hay que fraccionar o triturar hacerlo en CSB I con doble guante, bata y mascarilla.	Administrar con guante simple
ABIRATERONA	ZYTIGA 500 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA	1	No precisa. Si hay que fraccionar o triturar hacerlo en CSB I con doble guante, bata y mascarilla.	Administrar con guante simple
PACLITAXEL	ABRAXANE 5MG/ML POLVO PARA SUSPENSION PARA PERFUSION VIAL	1	Preparar en CSB Iib o AE, con doble guante, bata y mascarilla. Dispensar con el equipo de administración purgado.	Administrar con doble guante y bata; utilizar protección ocular cuando exista riesgo de salpicadura y respiratoria si hay posibilidad de inhalación.
ACENOCUMAROL	SINTROM 1MG COMPRIMIDOS	3	No necesita preparación. No se precisa protección salvo que el manipulador esté en situación de riesgo reproductivo que, si tiene que fraccionar, debe hacerlo en CSB I con doble guante, bata y mascarilla, y contactar con SPRL.	Sólo afecta a personal en riesgo reproductivo: administrar con guante simple, no fraccionar ni triturar.
AFATINIB	GIOTRIF 20 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA	1	No precisa. Si hay que fraccionar o triturar hacerlo en CSB I con doble guante, bata y mascarilla.	Administrar con guante simple.
AFATINIB	GIOTRIF 30 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA	1	No precisa. Si hay que fraccionar o triturar hacerlo en CSB I con doble guante, bata y mascarilla.	Administrar con guante simple.
AFATINIB	GIOTRIF 40 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA	1	No precisa. Si hay que fraccionar o triturar hacerlo en CSB I con doble guante, bata y mascarilla.	Administrar con guante simple.
PEMETREXED	ALIMTA 100 MG POLVO PARA CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA PERFUSION, VIAL	1	Preparar en CSB Iib o AE, con doble guante, bata y mascarilla. Utilizar SCTM. Dispensar con el equipo de administración purgado.	Administrar con doble guante y bata; utilizar protección ocular cuando exista riesgo de salpicadura y respiratoria si hay posibilidad de inhalación.
PEMETREXED	ALIMTA 500 MG POLVO PARA CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA PERFUSION, VIAL	1	Preparar en CSB Iib o AE, con doble guante, bata y mascarilla. Utilizar SCTM. Dispensar con el equipo de administración purgado.	Administrar con doble guante y bata; utilizar protección ocular cuando exista riesgo de salpicadura y respiratoria si hay posibilidad de inhalación.

PRINCIPIO ACTIVO	ESPECIALIDAD	CLASIFICACION NIOSH	PRECAUCIONES PREPARACIÓN	PRECAUCIONES DE ADMINISTRACIÓN
MELFALAN	ALKERAN 2 MG COMP RECUB	1	No precisa. Si hay que fraccionar o triturar hacerlo en CSB I con doble guante, bata y mascarilla.	Administrar con guante simple
AMBRISENTAN	VOLIBRIS 10 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA	3	No necesita preparación. No se precisa protección salvo que el manipulador esté en situación de riesgo reproductivo que, si tiene que fraccionar, debe hacerlo en CSB I con doble guante, bata y mascarilla, y contactar con SPRL.	Administración: Sólo afecta a personal en riesgo reproductivo: administrar con guante simple, no fraccionar ni triturar.
AMBRISENTAN	VOLIBRIS 5 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS, COMPRIMIDOS	3	No necesita preparación. No se precisa protección salvo que el manipulador esté en situación de riesgo reproductivo que, si tiene que fraccionar, debe hacerlo en CSB I con doble guante, bata y mascarilla, y contactar con SPRL.	Administración: Sólo afecta a personal en riesgo reproductivo: administrar con guante simple, no fraccionar ni triturar.
ANASTROZOL	ARIMIDEX 1 MG COMPRIMIDOS RECUB CON PELICULA	1	No precisa. Si hay que fraccionar o triturar hacerlo en CSB I con doble guante, bata y mascarilla.	Administrar con guante simple
AZATIOPRINA	IMUREL 50 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA	2	No precisa preparación. Administrar con guante simple.	Administrar con guante simple. Si es necesario fraccionar o triturar, utilizar la suspensión oral Fórmula Magistral.
AZATIOPRINA	IMUREL 50 MG POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE VIAL	2	Preparar en CSB IIb o AE, con doble guante, bata y mascarilla. Utilizar SCTM. Dispensar con el equipo de administración purgado.	Administrar con doble guante y bata; utilizar protección ocular cuando exista riesgo de salpicadura y respiratoria si hay posibilidad de inhalación.
BENDAMUSTINA	BENDAMUSTINA 100 mg vial	1	Preparar en CSB IIb o AE, con doble guante, bata y mascarilla. Utilizar SCTM. Dispensar con el equipo de administración purgado.	Administrar con doble guante y bata; utilizar protección ocular cuando exista riesgo de salpicadura y respiratoria si hay posibilidad de inhalación.
BENDAMUSTINA	BENDAMUSTINA 25 mg vial	1	Preparar en CSB IIb o AE, con doble guante, bata y mascarilla. Utilizar SCTM. Dispensar con el equipo de administración purgado.	Administrar con doble guante y bata; utilizar protección ocular cuando exista riesgo de salpicadura y respiratoria si hay posibilidad de inhalación.

PRINCIPIO ACTIVO	ESPECIALIDAD	CLASIFICACION NIOSH	PRECAUCIONES PREPARACIÓN	PRECAUCIONES DE ADMINISTRACIÓN
FLUDARABINA FOSFATO	BENEFLUR 10 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS	1	No precisa. Si hay que fraccionar o triturar hacerlo en CSB I con doble guante, bata y mascarilla.	Administrar con guante simple
BEXAROTENO	TARGRETIN 75 MG CAPSULAS BLANDAS	1	No precisa. Si hay que fraccionar o triturar hacerlo en CSB I con doble guante, bata y mascarilla.	Administrar con guante simple.
BICALUTAMIDA	BICALUTAMIDA 50 MG COMPRIMIDOS	1	Preparación: No precisa. Si hay que fraccionar o triturar hacerlo en CSB I con doble guante, bata y mascarilla.	Administrar con guante simple.
BLEOMICINA	BLEOMICINA 15 MG VIAL	1	Preparar en CSB IIB o AE, con doble guante, bata y mascarilla. Utilizar SCTM. Dispensar con el equipo de administración purgado.	Administrar con doble guante y bata; utilizar protección ocular cuando exista riesgo de salpicadura y respiratoria si hay posibilidad de inhalación.
BORTEZOMIB	BORTEZOMIB STADA 2,5 mg/ml 1,4 ml VIAL	1	Preparar en CSB IIB o AE, con doble guante, bata y mascarilla. Utilizar SCTM. Dispensar con el equipo de administración purgado.	Administrar con doble guante y bata; utilizar protección ocular cuando exista riesgo de salpicadura y respiratoria si hay posibilidad de inhalación.
BOSENTAN	BOSENTAN 125 mg COMP	3	No necesita preparación. No se precisa protección salvo que el manipulador esté en situación de riesgo reproductivo que, si tiene que fraccionar, debe hacerlo en CSB I con doble guante, bata y mascarilla, y contactar con SPRL. Administración: Sólo afecta a personal en riesgo reproductivo: administrar con guante simple, no fraccionar ni triturar.	Sólo afecta a personal en riesgo reproductivo: administrar con guante simple, no fraccionar ni triturar.
BOSENTAN	BOSENTAN 62,5 mg COMP	3	No necesita preparación. No se precisa protección salvo que el manipulador esté en situación de riesgo reproductivo que, si tiene que fraccionar, debe hacerlo en CSB I con doble guante, bata y mascarilla, y contactar con SPRL.	Administrar con guante simple.

PRINCIPIO ACTIVO	ESPECIALIDAD	CLASIFICACION NIOSH	PRECAUCIONES PREPARACIÓN	PRECAUCIONES DE ADMINISTRACIÓN
BOSUTINIB	BOSULIF 100 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA	1	Preparación: No precisa. Si hay que fraccionar o triturar hacerlo en CSB I con doble guante, bata y mascarilla.	Administrar con guante simple.
BOSUTINIB	BOSULIF 500 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA	1	No precisa. Si hay que fraccionar o triturar hacerlo en CSB I con doble guante, bata y mascarilla.	Administrar con guante simple.
BUSULFANO	BUSULFANO FRESENIUS KABI 6 MG/ML VIALES 10 ML CONCENT SOL PERFUS	1	Preparar en CSB IIb o AE, con doble guante, bata y mascarilla. Utilizar SCTM. Dispensar con el equipo de administración purgado.	Administrar con doble guante y bata; utilizar protección ocular cuando exista riesgo de salpicadura y respiratoria si hay posibilidad de inhalación.
CABERGOLINA	CABERGOLINA 0,5 MG COMP	3	No precisa preparación.	Sólo afecta a personal en riesgo reproductivo: administrar con guante simple, no fraccionar ni triturar. Si es necesario fraccionar o triturar, utilizar la suspensión oral.
CABERGOLINA	CABERGOLINA 2 MG COMP	3	No precisa preparación.	Sólo afecta a personal en riesgo reproductivo: administrar con guante simple, no fraccionar ni triturar. Si es necesario fraccionar o triturar, utilizar la suspensión oral.
CABERGOLINA	CABERGOLINA 1 MG COMP	3	No precisa preparación.	Sólo afecta a personal en riesgo reproductivo: administrar con guante simple, no fraccionar ni triturar. Si es necesario fraccionar o triturar, utilizar la suspensión oral.
DOXORUBICINA	CAELYX 20 MG VIAL 10 ML	1	Preparar en CSB IIb o AE, con doble guante, bata y mascarilla. Utilizar SCTM. Dispensar con el equipo de administración purgado.	Administrar con doble guante y bata; utilizar protección ocular cuando exista riesgo de salpicadura y respiratoria si hay posibilidad de inhalación. A
CAPECITABINA	CAPECITABINA ACCORD 150 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG	1	Preparación: No precisa.	Si hay que fraccionar o triturar hacerlo en CSB I con doble guante, bata y mascarilla. Administrar con guante simple.

PRINCIPIO ACTIVO	ESPECIALIDAD	CLASIFICACION NIOSH	PRECAUCIONES PREPARACIÓN	PRECAUCIONES DE ADMINISTRACIÓN
CAPECITABINA	CAPECITABINA ACCORD 500 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG	1	Preparación: No precisa.	Si hay que fraccionar o triturar hacerlo en CSB I con doble guante, bata y mascarilla. Administrar con guante simple.
CARBAMAZEPINA	CARBAMAZEPINA 200 MG	2	No precisa preparación. Administrar con guante simple.	Si es necesario fraccionar o triturar, utilizar la suspensión oral Fórmula Magistral.
CARBAMAZEPINA	CARBAMAZEPINA 400 MG	2	No precisa preparación. Administrar con guante simple.	Si es necesario fraccionar o triturar, utilizar la suspensión oral Fórmula Magistral.
CARBOPLATINO	CARBOPLATINO 450 MG (ACCORD) VIAL	1	Preparar en CSB IIb o AE, con doble guante, bata y mascarilla. Utilizar SCTM. Dispensar con el equipo de administración nurgado.	Administrar con doble guante y bata; utilizar protección ocular cuando exista riesgo de salpicadura y respiratoria si hay posibilidad de inhalación.
DAUNORUBICINA	CERUBIDINE 20 MG VIAL	1	Preparar en CSB IIb o AE, con doble guante, bata y mascarilla. Utilizar SCTM. Dispensar con el equipo de administración nurgado.	Administrar con doble guante y bata; utilizar protección ocular cuando exista riesgo de salpicadura y respiratoria si hay posibilidad de inhalación.
CICLOSPORINA	CICLOSPORINA 100 MG CAP	2	No precisa preparación.	Administrar con guante simple. Si es necesario fraccionar o triturar, utilizar la suspensión oral
CICLOSPORINA	SANDIMMUN NEORAL 100MG/ML SOLUCION ORAL 50ML	2	Preparación: No precisa. Si hay que preparar dosis unitarias hacerlo en CSB I con doble guante, bata y mascarilla.	Administrar con doble guante y bata; utilizar protección ocular cuando exista riesgo de salpicadura y respiratoria si hay posibilidad de inhalación.
CICLOSPORINA	CICLOSPORINA 25 MG CAP	2	No precisa preparación.	Administrar con guante simple. Si es necesario fraccionar o triturar, utilizar la suspensión oral
CICLOSPORINA	CICLOSPORINA 50 MG CAP	2	No precisa preparación.	Administrar con guante simple. Si es necesario fraccionar o triturar, utilizar la suspensión oral

PRINCIPIO ACTIVO	ESPECIALIDAD	CLASIFICACION NIOSH	PRECAUCIONES PREPARACIÓN	PRECAUCIONES DE ADMINISTRACIÓN
CICLOSPORINA	CICLOSPORINA 50 MG AMP	2	Abrir y manipular la ampolla en CSB I Ib o AE, con doble guante, bata y mascarilla. Utilizar SCTM en los procesos que sea posible. Dispensar con el equipo de administración purgado.	Administrar con doble guante y bata; utilizar protección ocular cuando exista riesgo de salpicadura y respiratoria si hay posibilidad de inhalación.
CISPLATINO	CISPLATINO ACCORD 1MG/ML CONCENTRADO SOL PERF 1 VIAL 100 ml	1	Preparar en CSB I Ib o AE, con doble guante, bata y mascarilla. Utilizar SCTM. Dispensar con el equipo de administración purgado.	Administrar con doble guante y bata; utilizar protección ocular cuando exista riesgo de salpicadura y respiratoria si hay posibilidad de inhalación.
CITARABINA	CITARABINA 500 MG VIAL	1	Preparar en CSB I Ib o AE, con doble guante, bata y mascarilla. Utilizar SCTM. Dispensar con el equipo de administración purgado.	Administrar con doble guante y bata; utilizar protección ocular cuando exista riesgo de salpicadura y respiratoria si hay posibilidad de inhalación.
CLONAZEPAM	CLONAZEPAM 0,5 MG COMP	3	No precisa preparación.	Administración: Sólo afecta a personal en riesgo reproductivo: administrar con guante simple, no fraccionar ni triturar. Si es necesario fraccionar o triturar, utilizar la suspensión oral.
CLONAZEPAM	RIVOTRIL 1 MG AMP 1 ML	3	No se precisa protección salvo que el manipulador esté en situación de riesgo reproductivo, en cuyo caso debe contactar con el SPRL. Sólo afecta a personal en riesgo reproductivo. No abrir las ampollas.	Administrar con doble guante y bata; utilizar protección ocular cuando exista riesgo de salpicadura y respiratoria si hay posibilidad de inhalación. Contactar con SPRL.
CLONAZEPAM	RIVOTRIL 2 MG COMP	3	No precisa preparación.	Sólo afecta a personal en riesgo reproductivo: administrar con guante simple, no fraccionar ni triturar. Si es necesario fraccionar o triturar, utilizar la suspensión oral.

PRINCIPIO ACTIVO	ESPECIALIDAD	CLASIFICACION NIOSH	PRECAUCIONES PREPARACIÓN	PRECAUCIONES DE ADMINISTRACIÓN
CLONAZEPAM	RIVOTRIL 2,5 MG/ML GOTAS 10 ML MF	3	No necesita preparación. No se precisa protección salvo que el manipulador esté en situación de riesgo reproductivo que, si tiene que preparar dosis unitarias, debe hacerlo en CSB I con doble guante, bata y mascarilla. y contactar con SPRL.	Sólo afecta a personal en riesgo reproductivo: administrar con doble guante y bata; utilizar protección ocular cuando exista riesgo de salpicadura y respiratoria si hay posibilidad de inhalación
COLCHICINA	COLCHICINA 1 MG GRANULOS	3	No necesita preparación. No se precisa protección salvo que el manipulador esté en situación de riesgo reproductivo que, si tiene que fraccionar, debe hacerlo en CSB I con doble guante, bata y mascarilla, y contactar con SPRL.	Sólo afecta a personal en riesgo reproductivo: administrar con guante simple, no fraccionar ni triturar.
COLCHICINA/DICICLOVERINA 0,5/5MG	COLCHIMAX 0,5/5MG	3	No necesita preparación. No se precisa protección salvo que el manipulador esté en situación de riesgo reproductivo que, si tiene que fraccionar, debe hacerlo en CSB I con doble guante, bata y mascarilla, y contactar con SPRL.	Sólo afecta a personal en riesgo reproductivo: administrar con guante simple, no fraccionar ni triturar.
CICLOSPORINA	COLIRIO 0,05% (FM)	2	Si hay que preparar dosis unitarias hacerlo en CSB I con doble guante, bata y mascarilla.	Administrar con doble guante y bata; utilizar protección ocular cuando exista riesgo de salpicadura y respiratoria si hay posibilidad de inhalación.
CICLOSPORINA	COLIRIO 0,1% MONODOSIS (FM)	2	Si hay que preparar dosis unitarias hacerlo en CSB I con doble guante, bata y mascarilla.	Administrar con doble guante y bata; utilizar protección ocular cuando exista riesgo de salpicadura y respiratoria si hay posibilidad de inhalación.
CICLOSPORINA	COLIRIO 1 % (FM)	2	Si hay que preparar dosis unitarias hacerlo en CSB I con doble guante, bata y mascarilla.	Administrar con doble guante y bata; utilizar protección ocular cuando exista riesgo de salpicadura y respiratoria si hay posibilidad de inhalación.

PRINCIPIO ACTIVO	ESPECIALIDAD	CLASIFICACION NIOSH	PRECAUCIONES PREPARACIÓN	PRECAUCIONES DE ADMINISTRACIÓN
TACROLIMUS	COLIRIO 0,03% 10 ML (FM)	2	Si hay que preparar dosis unitarias hacerlo en CSB I con doble guante, bata y mascarilla.	Administrar con doble guante y bata; utilizar protección ocular cuando exista riesgo de salpicadura y respiratoria si hay posibilidad de inhalación.
DACTINOMICINA	COSMEGEN 500 MCGVIAL	1	Preparar en CSB IIB o AE, con doble guante, bata y mascarilla. Utilizar SCTM. Dispensar con el equipo de administración purgado.	Administrar con doble guante y bata; utilizar protección ocular cuando exista riesgo de salpicadura y respiratoria si hay posibilidad de inhalación.
RAMUCIRUMAB	CYRAMZA 100 MG VIAL 10 ML	1	Preparar en CSB IIB o AE, con doble guante, bata y mascarilla. Utilizar SCTM. Dispensar con el equipo de administración purgado.	Administrar con doble guante y bata; utilizar protección ocular cuando exista riesgo de salpicadura y respiratoria si hay posibilidad de inhalación.
RAMUCIRUMAB	CYRAMZA 500 MG VIAL 50 ML	1	Preparar en CSB IIB o AE, con doble guante, bata y mascarilla. Utilizar SCTM. Dispensar con el equipo de administración purgado.	Administrar con doble guante y bata; utilizar protección ocular cuando exista riesgo de salpicadura y respiratoria si hay posibilidad de inhalación.
CITARABINA	CYTOSAR 100 mg VIAL 5 ML AMP	1	Preparar en CSB IIB o AE, con doble guante, bata y mascarilla. Utilizar SCTM. Dispensar con el equipo de administración purgado.	Administrar con doble guante y bata; utilizar protección ocular cuando exista riesgo de salpicadura y respiratoria si hay posibilidad de inhalación.
DACARBAZINA	DACARBAZINA 500 MG VIAL	1	Preparar en CSB IIB o AE, con doble guante, bata y mascarilla. Utilizar SCTM. Dispensar con el equipo de administración purgado.	Administrar con doble guante y bata; utilizar protección ocular cuando exista riesgo de salpicadura y respiratoria si hay posibilidad de inhalación.
TRIPTORELINA	DECAPEPTYL SEMESTRAL 22,5MG VIAL	1	Preparar en CSB IIB o AE, con doble guante, bata y mascarilla. Utilizar SCTM. Dispensar con el equipo de administración purgado.	Administrar con doble guante y bata; utilizar protección ocular cuando exista riesgo de salpicadura y respiratoria si hay posibilidad de inhalación.
TRIPTORELINA	DECAPEPTYL TRIMESTRAL 11,25 MG VIAL	1	Preparar en CSB IIB o AE, con doble guante, bata y mascarilla. Utilizar SCTM. Dispensar con el equipo de administración purgado.	Administrar con doble guante y bata; utilizar protección ocular cuando exista riesgo de salpicadura y respiratoria si hay posibilidad de inhalación.

PRINCIPIO ACTIVO	ESPECIALIDAD	CLASIFICACION NIOSH	PRECAUCIONES PREPARACIÓN	PRECAUCIONES DE ADMINISTRACIÓN
DINOPROSTONA	DINOPROSTONA 10 MG DISP VAG	3	No precisa preparación.	Sólo afecta a personal en riesgo reproductivo: manipular con doble guante y bata.
DOCETAXEL	DOCETAXEL 160 MG VIAL 8 ML	1	Preparar en CSB IIb o AE, con doble guante, bata y mascarilla. Utilizar SCTM. Dispensar con el equipo de administración purgado.	Administrar con doble guante y bata; utilizar protección ocular cuando exista riesgo de salpicadura y respiratoria si hay posibilidad de inhalación.
DOXORRUBICINA	DOXORRUBICINA 50 MG VIAL 25 ML	1	Preparar en CSB IIb o AE, con doble guante, bata y mascarilla. Utilizar SCTM. Dispensar con el equipo de administración purgado.	Administrar con doble guante y bata; utilizar protección ocular cuando exista riesgo de salpicadura y respiratoria si hay posibilidad de inhalación.
EFAVIRENZ	EFAVIRENZ 600 MG COMP	3	No precisa preparación.	Administración: Sólo afecta a personal en riesgo reproductivo: administrar con guante simple, no fraccionar ni triturar.
VINDESINA	ENISON 5 MG VIAL	1	Preparar en CSB IIb o AE, con doble guante, bata y mascarilla. Utilizar SCTM. Dispensar con el equipo de administración purgado.	Administrar con doble guante y bata; utilizar protección ocular cuando exista riesgo de salpicadura y respiratoria si hay posibilidad de inhalación.
ATEZOLIZUMAB	ATEZOLIZUMAB 1200 MG VIAL 20 ML	1	Preparar en CSB IIb o AE, con doble guante, bata y mascarilla. Utilizar SCTM. Dispensar con el equipo de administración purgado.	Administrar con doble guante y bata; utilizar protección ocular cuando exista riesgo de salpicadura y respiratoria si hay posibilidad de inhalación.
BUSULFANO	BUSILVEX 60 MG VIAL 10 ML	1	Preparar en CSB IIb o AE, con doble guante, bata y mascarilla. Utilizar SCTM. Dispensar con el equipo de administración purgado.	Administrar con doble guante y bata; utilizar protección ocular cuando exista riesgo de salpicadura y respiratoria si hay posibilidad de inhalación.
ENTECAVIR	BARACLUE 0,5 MG COMPRIMIDOS	2	No precisa. Si hay que fraccionar o triturar hacerlo en CSB I con doble guante, bata y mascarilla.	Administrar con guante simple.
ENTECAVIR	BARACLUE 1 MG COMPRIMIDOS	2	No precisa. Si hay que fraccionar o triturar hacerlo en CSB I con doble guante, bata y mascarilla.	Administrar con guante simple.

PRINCIPIO ACTIVO	ESPECIALIDAD	CLASIFICACION NIOSH	PRECAUCIONES PREPARACIÓN	PRECAUCIONES DE ADMINISTRACIÓN
ENZALUTAMIDA	ENZALUTAMIDA 40 MG COMP REC	1	No precisa. Si hay que fraccionar o triturar hacerlo en CSB I con doble guante, bata y mascarilla.	Administrar con guante simple.
EPIRRUBICINA	EPIRRUBICINA 50 MG VIAL 25 ML	1	Preparar en CSB IIb o AE, con doble guante, bata y mascarilla. Utilizar SCTM. Dispensar con el equipo de administración purgado.	Administrar con doble guante y bata; utilizar protección ocular cuando exista riesgo de salpicadura y respiratoria si hay posibilidad de inhalación.
EPIRRUBICINA	EPIRRUBICINA 150 MG VIAL 75 ML	1	Preparar en CSB IIb o AE, con doble guante, bata y mascarilla. Utilizar SCTM. Dispensar con el equipo de administración purgado.	Administrar con doble guante y bata; utilizar protección ocular cuando exista riesgo de salpicadura y respiratoria si hay posibilidad de inhalación.
ESPIRONOLACTONA	ESPIRONOLACTONA 100 MG COMP	2	No precisa preparación.	Administrar con guante simple. Si es necesario fraccionar o triturar, utilizar la suspensión oral Fórmula Magistral
ESPIRONOLACTONA	ESPIRONOLACTONA 25 MG COMP	2	No precisa preparación.	Administrar con guante simple. Si es necesario fraccionar o triturar, utilizar la suspensión oral Fórmula Magistral
ETOPOSIDO	ETOPOSIDO 100 MG VIAL 5 ML	1	Preparar en CSB IIb o AE, con doble guante, bata y mascarilla. Utilizar SCTM. Dispensar con el equipo de administración purgado.	Administrar con doble guante y bata; utilizar protección ocular cuando exista riesgo de salpicadura y respiratoria si hay posibilidad de inhalación.
EVEROLIMUS	CERTICAN 0,5 MG COMP	1	No precisa preparación. Si hay que fraccionar o triturar considerar comprimidos buscodispersables o hacerlo en CSB I con doble guante, bata y mascarilla.	Administrar con guante simple
EVEROLIMUS	CERTICAN 0,75 MG COMP	1	No precisa preparación. Si hay que fraccionar o triturar considerar comprimidos buscodispersables o hacerlo en CSB I con doble guante, bata y mascarilla.	Administrar con guante simple

PRINCIPIO ACTIVO	ESPECIALIDAD	CLASIFICACION NIOSH	PRECAUCIONES PREPARACIÓN	PRECAUCIONES DE ADMINISTRACIÓN
EVEROLIMUS	CERTICAN 1 MG COMP	1	No precisa preparación. Si hay que fraccionar o triturar considerar comprimidos buscodispersables o hacerlo en CSB I con doble guante, bata y mascarilla.	Administrar con guante simple
EVEROLIMUS	AFINITOR 10 MG COMP	1	No precisa preparación. Si hay que fraccionar o triturar considerar comprimidos buscodispersables o hacerlo en CSB I con doble guante, bata y mascarilla.	Administrar con guante simple
EVEROLIMUS	VOTUBIA 10 MG COMP	1	No precisa preparación. Si hay que fraccionar o triturar considerar comprimidos buscodispersables o hacerlo en CSB I con doble guante, bata y mascarilla.	Administrar con guante simple
EVEROLIMUS	AFINITOR 5 MG COMP	1	No precisa preparación. Si hay que fraccionar o triturar considerar comprimidos buscodispersables o hacerlo en CSB I con doble guante, bata y mascarilla.	Administrar con guante simple
DOXORRUBICINA	FARMIBLASTINA SOL 50 MG VIAL	1	Preparar en CSB IIb o AE, con doble guante, bata y mascarilla. Utilizar SCTM. Dispensar con el equipo de administración nurgado.	Administrar con doble guante y bata; utilizar protección ocular cuando exista riesgo de salpicadura y respiratoria si hay posibilidad de inhalación.
FULVESTRANT	FASLODEX 250 MG 1 JERINGA PREC 5ML SOL	1	No precisa preparación.	Administrar con doble guante y bata; utilizar protección ocular cuando exista riesgo de salpicadura.
FENITOINA	FENITOINA 100 MG COMP	2	No precisa preparación.	Administrar con guante simple. Si es necesario fraccionar o triturar, utilizar la suspensión oral Fórmula Magistral.

PRINCIPIO ACTIVO	ESPECIALIDAD	CLASIFICACION NIOSH	PRECAUCIONES PREPARACIÓN	PRECAUCIONES DE ADMINISTRACIÓN
FENITOINA	FENITOINA 250 MG AMP 5 ML	2	Abrir y manipular la ampolla en CSB IIB o AE, con doble guante, bata y mascarilla. Si no fuera posible preparar en cabina, utilizar protección ocular y respiratoria.	Administrar con doble guante y bata; utilizar protección ocular cuando exista riesgo de salpicadura y respiratoria si hay posibilidad de inhalación.
FENITOINA	FENITOINA 100 MG VIAL	2	Abrir y manipular en CSB IIB o AE, con doble guante, bata y mascarilla. Si no fuera posible preparar en cabina, utilizar protección ocular y respiratoria.	Administrar con doble guante y bata; utilizar protección ocular cuando exista riesgo de salpicadura y respiratoria si hay posibilidad de inhalación.
FENITOINA	FENITOINA 50 MG COMP	2	No precisa preparación.	Administrar con guante simple. Si es necesario fraccionar o triturar, utilizar la suspensión oral Fórmula Magistral.
FENOXIBENZAMIDA	FENOXIBENZAMIDA 10 MG CAP	2	No precisa preparación.	Administrar con guante simple. Si es necesario fraccionar o triturar, utilizar la suspensión oral Fórmula Magistral.
FINASTERIDA	FINASTERIDA 5 MG COMP	3	No necesita preparación.	No se precisa protección salvo que el manipulador esté en situación de riesgo reproductivo que, si tiene que fraccionar, debe hacerlo en CSB I con doble guante, bata y mascarilla. y contactar con SPRL.
FINGOLIMOD	GILENYA 0,5 MG CAP	2	No precisa. Si hay que fraccionar o triturar hacerlo en CSB I con doble guante, bata y mascarilla.	Administrar con guante simple.
FLUCONAZOL	FLUCONAZOL 100 MG BOLSA 50 ML	3	No se precisa protección salvo que el manipulador esté en situación de riesgo reproductivo, en cuyo caso debe contactar con el SPRL.	Sólo afecta a personal en riesgo reproductivo: administrar con doble guante y bata; utilizar protección ocular cuando exista riesgo de salpicadura y respiratoria si hay posibilidad de inhalación.
FLUCONAZOL	FLUCONAZOL 100 MG CAP	3	No precisa preparación.	Sólo afecta a personal en riesgo reproductivo: administrar con guante simple, no fraccionar ni triturar. Si es necesario fraccionar o triturar, utilizar la suspensión oral.

PRINCIPIO ACTIVO	ESPECIALIDAD	CLASIFICACION NIOSH	PRECAUCIONES PREPARACIÓN	PRECAUCIONES DE ADMINISTRACIÓN
FLUCONAZOL	FLUCONAZOL 200 MG BOLSA 100 ML	3	No se precisa protección salvo que el manipulador esté en situación de riesgo reproductivo, en cuyo caso debe contactar con el SPRL.	Sólo afecta a personal en riesgo reproductivo: administrar con doble guante y bata; utilizar protección ocular cuando exista riesgo de salpicadura y respiratoria si hay posibilidad de inhalación.
FLUCONAZOL	FLUCONAZOL 50 MG/5ML SUSP 35 ML	3	No se precisa protección salvo que el manipulador esté en situación de riesgo reproductivo, en cuyo caso debe contactar con el SPRL.	Sólo afecta a personal en riesgo reproductivo: administrar con doble guante y bata; utilizar protección ocular cuando exista riesgo de salpicadura y respiratoria si hay posibilidad de inhalación.
FLUOROURACILO	FLUOROURACILO 5 G VIAL 100 ML	1	Preparar en CSB IIB o AE, con doble guante, bata y mascarilla. Utilizar SCTM. Dispensar con el equipo de administración purgado.	Administrar con doble guante y bata; utilizar protección ocular cuando exista riesgo de salpicadura y respiratoria si hay posibilidad de inhalación.
PERAMPANEL	FYCOMPA 12 MG COMP	3	No necesita preparación. No se precisa protección salvo que el manipulador esté en situación de riesgo reproductivo que, si tiene que fraccionar, debe hacerlo en CSB I con doble guante, bata y mascarilla, y contactar con SPRL.	Sólo afecta a personal en riesgo reproductivo: administrar con guante simple, no fraccionar ni triturar.
PERAMPANEL	FYCOMPA 2 MG COMP	3	No necesita preparación. No se precisa protección salvo que el manipulador esté en situación de riesgo reproductivo que, si tiene que fraccionar, debe hacerlo en CSB I con doble guante, bata y mascarilla, y contactar con SPRL.	Sólo afecta a personal en riesgo reproductivo: administrar con guante simple, no fraccionar ni triturar.
PERAMPANEL	FYCOMPA 8 MG COMP	3	No necesita preparación. No se precisa protección salvo que el manipulador esté en situación de riesgo reproductivo que, si tiene que fraccionar, debe hacerlo en CSB I con doble guante, bata y mascarilla, y contactar con SPRL.	Sólo afecta a personal en riesgo reproductivo: administrar con guante simple, no fraccionar ni triturar.

PRINCIPIO ACTIVO	ESPECIALIDAD	CLASIFICACION NIOSH	PRECAUCIONES PREPARACIÓN	PRECAUCIONES DE ADMINISTRACIÓN
GANCICLOVIR	GANCICLOVIR 500 MG VIAL	2	Preparar en CSB Iib o AE, con doble guante, bata y mascarilla. Utilizar SCTM. Dispensar con el equipo de administración nurgado.	Administrar con doble guante y bata; utilizar protección ocular cuando exista riesgo de salpicadura y respiratoria si hay posibilidad de inhalación.
GANIRELIX	GANIRELIX 0,25 MG JER PRC 0,5 ML	3	No precisa preparación.	Sólo afecta a personal en riesgo reproductivo: administrar con doble guante y bata; utilizar protección ocular cuando exista riesgo de salpicadura y respiratoria si hay posibilidad de inhalación
GEFITINIB	GEFITINIB 0,25 MG COMP	1	No precisa preparación.	Si hay que fraccionar o triturar considerar comprimidos bucodispersables o hacerlo en CSB I con doble guante, bata y mascarilla. Administrar con guante simple
GEFITINIB	GEFITINIB 250 MG COMP (IRESSA)	1	No precisa preparación.	Si hay que fraccionar o triturar considerar comprimidos buscodispersables o hacerlo en CSB I con doble guante, bata y mascarilla. Administrar con guante simple
GEMCITABINA	GEMCITABINA 2G VIAL 50 ML	1	Preparar en CSB Iib o AE, con doble guante, bata y mascarilla. Utilizar SCTM. Dispensar con el equipo de administración nurgado.	Administrar con doble guante y bata; utilizar protección ocular cuando exista riesgo de salpicadura y respiratoria si hay posibilidad de inhalación.
CICLOFOSFAMIDA	GENOXAL 1 GR VIAL	1	Preparar en CSB Iib o AE, con doble guante, bata y mascarilla. Utilizar SCTM. Dispensar con el equipo de administración nurgado.	Administrar con doble guante y bata; utilizar protección ocular cuando exista riesgo de salpicadura y respiratoria si hay posibilidad de inhalación.
CICLOFOSFAMIDA	GENOXAL 50 MG COMP	1	No precisa preparación.	Si hay que fraccionar o triturar hacerlo en CSB I con doble guante, bata y mascarilla. Administrar con guante simple
ERIBULINA BASE	HALAVEN 0,88 MG/ML SOLUCION INYECTABLE VIAL 2ML	1	Preparar en CSB Iib o AE, con doble guante, bata y mascarilla. Utilizar SCTM. Dispensar con el equipo de administración nurgado.	Administrar con doble guante y bata; utilizar protección ocular cuando exista riesgo de salpicadura y respiratoria si hay posibilidad de inhalación.

PRINCIPIO ACTIVO	ESPECIALIDAD	CLASIFICACION NIOSH	PRECAUCIONES PREPARACIÓN	PRECAUCIONES DE ADMINISTRACIÓN
TOPOTECAN	HYCANTIN 0,25 MG CAP	1	No precisa.	Si hay que fraccionar o triturar hacerlo en CSB I con doble guante, bata y mascarilla. Administrar con guante simple.
TOPOTECAN	HYCANTIN 1 MG CAP	1	No precisa.	Si hay que fraccionar o triturar hacerlo en CSB I con doble guante, bata y mascarilla. Administrar con guante simple.
TOPOTECAN	HYCANTIN 4 MG VIAL	1	Preparar en CSB Iib o AE, con doble guante, bata y mascarilla. Utilizar SCTM. Dispensar con el equipo de administración purgado.	Administrar con doble guante y bata; utilizar protección ocular cuando exista riesgo de salpicadura y respiratoria si hay posibilidad de inhalación.
HIDROXIUREA	HYDREA 500 MG CAPS	1	No precisa. Si hay que dispersar en agua hacerlo con doble guante, bata y mascarilla.	Administrar con guante simple. Si hay que dispersar en agua hacerlo con doble guante, bata y mascarilla.
IMATINIB	IMATINIB 100 MG COMP	1	No precisa. Si hay que dispersar en agua hacerlo con doble guante, bata y mascarilla.	Administrar con guante simple. Si hay que dispersar en agua hacerlo con doble guante, bata y mascarilla.
IMATINIB	IMATINIB 400 MG COMP	1	No precisa. Si hay que dispersar en agua hacerlo con doble guante, bata y mascarilla.	Administrar con guante simple. Si hay que dispersar en agua hacerlo con doble guante, bata y mascarilla.
IRINOTECAN	IRINOTECAN 500 MG VIAL 25 ML	1	Preparar en CSB Iib o AE, con doble guante, bata y mascarilla. Utilizar SCTM. Dispensar con el equipo de administración purgado.	Administrar con doble guante y bata; utilizar protección ocular cuando exista riesgo de salpicadura y respiratoria si hay posibilidad de inhalación.
VINFLUNINA	JAVLOR 250 MG VIAL 10 ML	1	Preparar en CSB Iib o AE, con doble guante, bata y mascarilla. Utilizar SCTM. Dispensar con el equipo de administración purgado.	Administrar con doble guante y bata; utilizar protección ocular cuando exista riesgo de salpicadura y respiratoria si hay posibilidad de inhalación.
VINFLUNINA	JAVLOR 50 MG VIAL 2 ML	1	Preparar en CSB Iib o AE, con doble guante, bata y mascarilla. Utilizar SCTM. Dispensar con el equipo de administración purgado.	Administrar con doble guante y bata; utilizar protección ocular cuando exista riesgo de salpicadura y respiratoria si hay posibilidad de inhalación.

PRINCIPIO ACTIVO	ESPECIALIDAD	CLASIFICACION NIOSH	PRECAUCIONES PREPARACIÓN	PRECAUCIONES DE ADMINISTRACIÓN
CABAZITAXEL	JEVTANA 60 MG VIAL 1,5 ML	1	Preparar en CSB I Ib o AE, con doble guante, bata y mascarilla. Utilizar SCTM. Dispensar con el equipo de administración purgado.	Administrar con doble guante y bata; utilizar protección ocular cuando exista riesgo de salpicadura y respiratoria si hay posibilidad de inhalación.
TRASTUZUMAB EMTANSINA	KADCYLA 100 MG VIAL 5 ML POLVO SOLUC PERFUSION	1	Preparar en CSB I Ib o AE, con doble guante, bata y mascarilla. Utilizar SCTM. Dispensar con el equipo de administración purgado.	Administrar con doble guante y bata; utilizar protección ocular cuando exista riesgo de salpicadura y respiratoria si hay posibilidad de inhalación.
TRASTUZUMAB EMTANSINA	KADCYLA 160 MG 1 VIAL 8 ML POLVO SOL PERF	1	Preparar en CSB I Ib o AE, con doble guante, bata y mascarilla. Utilizar SCTM. Dispensar con el equipo de administración purgado.	Administrar con doble guante y bata; utilizar protección ocular cuando exista riesgo de salpicadura y respiratoria si hay posibilidad de inhalación.
PEMBROLIZUMAB	KEYTRUDA 100 MG VIAL 4 ML	1	Preparar en CSB I Ib o AE, con doble guante, bata y mascarilla. Utilizar SCTM. Dispensar con el equipo de administración purgado.	Administrar con doble guante y bata; utilizar protección ocular cuando exista riesgo de salpicadura y respiratoria si hay posibilidad de inhalación.
LAMIVUDINA/ZIDOVUDINA	LAMIVUDINA/ZIDOVUDINA 150/30MG COMP	2	No precisa. Si hay que fraccionar o triturar hacerlo en CSB I con doble guante, bata y mascarilla.	Administrar con guante simple.
LENALIDOMIDA	REVLIMID 10MG CAP	1	No precisa. Si hay que fraccionar o triturar hacerlo en CSB I con doble guante, bata y mascarilla.	Administrar con guante simple. Si hay que fraccionar o triturar hacerlo en CSB I con doble guante, bata y mascarilla.
LENALIDOMIDA	REVLIMID 15MG CAP	1	No precisa. Si hay que fraccionar o triturar hacerlo en CSB I con doble guante, bata y mascarilla.	Administrar con guante simple. Si hay que fraccionar o triturar hacerlo en CSB I con doble guante, bata y mascarilla.
LENALIDOMIDA	REVLIMID 25 MG CAP	1	No precisa. Si hay que fraccionar o triturar hacerlo en CSB I con doble guante, bata y mascarilla.	Administrar con guante simple. Si hay que fraccionar o triturar hacerlo en CSB I con doble guante, bata y mascarilla.
LENALIDOMIDA	REVLIMID 5 MG CAP	1	No precisa. Si hay que fraccionar o triturar hacerlo en CSB I con doble guante, bata y mascarilla.	Administrar con guante simple. Si hay que fraccionar o triturar hacerlo en CSB I con doble guante, bata y mascarilla.

PRINCIPIO ACTIVO	ESPECIALIDAD	CLASIFICACION NIOSH	PRECAUCIONES PREPARACIÓN	PRECAUCIONES DE ADMINISTRACIÓN
CLORAMBUCILO	LEUKERAN 2 MG COMP	1	No precisa. Si hay que fraccionar o triturar hacerlo en CSB I con doble guante, bata y mascarilla.	Administrar con guante simple. Si hay que fraccionar o triturar hacerlo en CSB I con doble guante, bata y mascarilla.
CLADRIBINA	LEUSTATIN 10 MG VIAL 10 ML	1	Preparar en CSB Iib o AE, con doble guante, bata y mascarilla. Utilizar SCTM. Dispensar con el equipo de administración purgado.	Administrar con doble guante y bata; utilizar protección ocular cuando exista riesgo de salpicadura y respiratoria si hay posibilidad de inhalación.
MEDROXIPROGESTERONA	MEDROXIPROGESTERONA 150 MG VIAL	2	Abrir y manipular en CSB Iib o AE, con doble guante, bata y mascarilla. Si no fuera posible preparar en cabina, utilizar protección ocular y respiratoria.	Administrar con doble guante y bata; utilizar protección ocular cuando exista riesgo de salpicadura y respiratoria si hay posibilidad de inhalación.
MEGESTROL	MEGESTROL 160 MG COMP	1	No precisa preparación.	Administrar con guante simple. Si es necesario fraccionar o triturar, utilizar la suspensión oral .
MELFALAN	MELFALAN 50 MG VIAL	1	Preparar en CSB Iib o AE, con doble guante, bata y mascarilla. Utilizar SCTM. Dispensar con el equipo de administración purgado.	Administrar con doble guante y bata; utilizar protección ocular cuando exista riesgo de salpicadura y respiratoria si hay posibilidad de inhalación.
MERCAPTOPURINA	MERCAPTOPURINA 50 MG COMP	1	No precisa preparación.	Administrar con guante simple. Si es necesario fraccionar o triturar, utilizar la suspensión oral Fórmula Magistral.
MERCAPTOPURINA	MERCAPTOPURINA 25 MG COMP	1	No precisa preparación.	Administrar con guante simple. Si es necesario fraccionar o triturar, utilizar la suspensión oral Fórmula Magistral.
METOTREXATO	METOTREXATO 10 MG JER 1ML	1	No precisa preparación.	Administrar con doble guante y bata; utilizar protección ocular cuando exista riesgo de salpicadura y respiratoria si hay posibilidad de inhalación.
METOTREXATO	METOTREXATO 2,5 MG COMP 1 ML	1	No precisa. Si hay que fraccionar o triturar hacerlo en CSB I con doble guante, bata y mascarilla.	Administrar con guante simple. Si hay que fraccionar o triturar ver Preparación.

PRINCIPIO ACTIVO	ESPECIALIDAD	CLASIFICACION NIOSH	PRECAUCIONES PREPARACIÓN	PRECAUCIONES DE ADMINISTRACIÓN
METOTREXATO	METOTREXATO 50 MG VIAL 2 ML	1	Preparar en CSB I Ib o AE, con doble guante, bata y mascarilla. Utilizar SCTM. Dispensar con el equipo de administración purgado.	Administrar con doble guante y bata; utilizar protección ocular cuando exista riesgo de salpicadura y respiratoria si hay posibilidad de inhalación.
METOTREXATO	METOTREXATO 500 MG VIAL 20 ML	1	Preparar en CSB I Ib o AE, con doble guante, bata y mascarilla. Utilizar SCTM. Dispensar con el equipo de administración purgado.	Administrar con doble guante y bata; utilizar protección ocular cuando exista riesgo de salpicadura y respiratoria si hay posibilidad de inhalación.
BRENTUXIMAB VEDOTIN	ADCETRIS 50 MG 1 VIAL	1	Preparar en CSB I Ib o AE, con doble guante, bata y mascarilla. Utilizar SCTM. Dispensar con el equipo de administración purgado.	Administrar con doble guante y bata; utilizar protección ocular cuando exista riesgo de salpicadura y respiratoria si hay posibilidad de inhalación.
DECITABINA	DACOGEN 50 MG 1 VIAL	1	Preparar en CSB I Ib o AE, con doble guante, bata y mascarilla. Utilizar SCTM. Dispensar con el equipo de administración purgado.	Administrar con doble guante y bata; utilizar protección ocular cuando exista riesgo de salpicadura y respiratoria si hay posibilidad de inhalación.
PLERIXAFOR	MOZOBIL 20MG/ML 1 VIAL 1,2ML SOLUCION INYECTABLE	3	No se precisa protección salvo que el manipulador esté en situación de riesgo reproductivo, en cuyo caso debe contactar con SPRL.	Sólo afecta a personal en riesgo reproductivo: no preparar los viales. Administrar con doble guante y bata; utilizar protección ocular cuando exista riesgo de salpicadura y respiratoria si hay posibilidad de inhalación.
TIOTEPA	TEPADINA 100 MG VIAL	1	Preparar en CSB I Ib o AE, con doble guante, bata y mascarilla. Utilizar SCTM. Dispensar con el equipo de administración purgado.	Administrar con doble guante y bata; utilizar protección ocular cuando exista riesgo de salpicadura y respiratoria si hay posibilidad de inhalación.
TIOTEPA	TEPADINA 15 MG VIAL	1	Preparar en CSB I Ib o AE, con doble guante, bata y mascarilla. Utilizar SCTM. Dispensar con el equipo de administración purgado.	Administrar con doble guante y bata; utilizar protección ocular cuando exista riesgo de salpicadura y respiratoria si hay posibilidad de inhalación.

PRINCIPIO ACTIVO	ESPECIALIDAD	CLASIFICACION NIOSH	PRECAUCIONES PREPARACIÓN	PRECAUCIONES DE ADMINISTRACIÓN
TEMSIROLIMUS	TORISEL 30 MG VIAL	1	Preparar en CSB IIB o AE, con doble guante, bata y mascarilla. Utilizar SCTM. Dispensar con el equipo de administración nurgado .	Administrar con doble guante y bata; utilizar protección ocular cuando exista riesgo de salpicadura y respiratoria si hay posibilidad de inhalación .
ARSENICO TRIHIDROXIDO	TRISENOX 10 MG AMP	1	Abrir y manipular la ampolla en CSB IIB o AE, con doble guante, bata y mascarilla. Utilizar SCTM en los procesos que sea posible. Dispensar con el equipo de administración nurgado .	Administrar con doble guante y bata; utilizar protección ocular cuando exista riesgo de salpicadura y respiratoria si hay posibilidad de inhalación .
5-AZACITIDINA	VIDAZA 25 MG/ML VIAL	1	Preparar en CSB IIB o AE, con doble guante, bata y mascarilla.	Administrar con doble guante y bata; utilizar protección ocular cuando exista riesgo de salpicadura y respiratoria si hay posibilidad de inhalación .
TRABECTEDIN	YONDELIS 0,25 MG VIAL	1	Preparar en CSB IIB o AE, con doble guante, bata y mascarilla.	Administrar con doble guante y bata; utilizar protección ocular cuando exista riesgo de salpicadura y respiratoria si hay posibilidad de inhalación .
TRABECTEDIN	YONDELIS 1 MG VIAL	1	Preparar en CSB IIB o AE, con doble guante, bata y mascarilla.	Administrar con doble guante y bata; utilizar protección ocular cuando exista riesgo de salpicadura y respiratoria si hay posibilidad de inhalación .
MIDOSTAURINA	RYDAPT 25 MG CAP	1	No precisa. Si hay que fraccionar o triturar hacerlo en CSB I con doble guante, bata y mascarilla .	Administrar con guante simple. Si hay que fraccionar o triturar hacerlo en CSB I con doble guante, bata y mascarilla .
MIFEPRISTONA	MIFEGYNE 200 MG COMP	3	No necesita preparación. No se precisa protección salvo que el manipulador esté en situación de riesgo reproductivo que, si tiene que fraccionar, debe hacerlo en CSB I con doble guante, bata y mascarilla, y contactar con SPRL .	Sólo afecta a personal en riesgo reproductivo: administrar con guante simple, no fraccionar ni triturar.

PRINCIPIO ACTIVO	ESPECIALIDAD	CLASIFICACION NIOSH	PRECAUCIONES PREPARACIÓN	PRECAUCIONES DE ADMINISTRACIÓN
MISOPROSTOL	CYTOTEC 200 MG COMP	3	No necesita preparación. No se precisa protección salvo que el manipulador esté en situación de riesgo reproductivo que, si tiene que fraccionar, debe hacerlo en CSB I con doble guante, bata y mascarilla, y contactar con SPRL.	Sólo afecta a personal en riesgo reproductivo: administrar con guante simple, no fraccionar ni triturar.
MISOPROSTOL	MISOFAR 200 MG COMP VAGINAL	3	No precisa preparación.	Sólo afecta a personal en riesgo reproductivo: manipular con doble guante y bata.
MISOPROSTOL	MISOFAR 25 MG COMP VAGINAL	3	No precisa preparación. Sólo afecta a personal en riesgo reproductivo: manipular con doble guante y bata.	Sólo afecta a personal en riesgo reproductivo: manipular con doble guante y bata.
MITOMICINA C	MITOMYCIN-C 20 MG 1 VIAL	1	Preparar en CSB IIb o AE, con doble guante, bata y mascarilla. Utilizar SCTM. Dispensar con el equipo de administración purgado.	Administrar con doble guante y bata; utilizar protección ocular cuando exista riesgo de salpicadura y respiratoria si hay posibilidad de inhalación.
MITOMICINA C	MITOMYCIN-C 10 MG VIAL	1	Preparar en CSB IIb o AE, con doble guante, bata y mascarilla. Utilizar SCTM. Dispensar con el equipo de administración purgado.	Administrar con doble guante y bata; utilizar protección ocular cuando exista riesgo de salpicadura y respiratoria si hay posibilidad de inhalación.
MITOMICINA C	MITOMYCIN-C 40 MG VIAL	1	Preparar en CSB IIb o AE, con doble guante, bata y mascarilla. Utilizar SCTM. Dispensar con el equipo de administración purgado.	Administrar con doble guante y bata; utilizar protección ocular cuando exista riesgo de salpicadura y respiratoria si hay posibilidad de inhalación.
TACROLIMUS	MODIGRAF 1 MG SOBRES SUSP ORAL	2	Preparar en CSB I con doble guante, bata y mascarilla.	Administrar con doble guante y bata; utilizar protección ocular cuando exista riesgo de salpicadura y respiratoria si hay posibilidad de inhalación.
FOTEMUSTINA	MUSTOFORAN 208 MG VIAL	1	Preparar en CSB IIb o AE, con doble guante, bata y mascarilla. Utilizar SCTM. Dispensar con el equipo de administración purgado.	Administrar con doble guante y bata; utilizar protección ocular cuando exista riesgo de salpicadura y respiratoria si hay posibilidad de inhalación.

PRINCIPIO ACTIVO	ESPECIALIDAD	CLASIFICACION NIOSH	PRECAUCIONES PREPARACIÓN	PRECAUCIONES DE ADMINISTRACIÓN
BUSULFANO	MYLERAN 2 MG COMP RECUB	1	No precisa preparación.	Administrar con guante simple. Si es necesario fraccionar o triturar, utilizar la suspensión oral Fórmula Magistral.
DOXORUBICINA LIPOSOMAS	MYOCET 50 MG VIAL	1	Preparar en CSB IIb o AE, con doble guante, bata y mascarilla. Utilizar SCTM. Dispensar con el equipo de administración purgado.	Administrar con doble guante y bata; utilizar protección ocular cuando exista riesgo de salpicadura y respiratoria si hay posibilidad de inhalación.
PROCARBAZINA	NATULAN 50 MG CAP	1	No precisa. Si hay que fraccionar o triturar hacerlo en CSB I con doble guante, bata y mascarilla.	Administrar con guante simple.
VINORELBINA	NAVELBINE 20 MG CAPSULAS	1	No precisa preparación.	Administrar con guante simple.
VINORELBINA	NAVELBINE 30 MG CAPSULAS	1	No precisa preparación.	Administrar con guante simple.
ACITRETINA	NEOTIGASON 10 MG CAP	3	No necesita preparación. No se precisa protección salvo que el manipulador esté en situación de riesgo reproductivo que, si tiene que fraccionar, debe hacerlo en CSB I con doble guante, bata y mascarilla, y contactar con SPRL.	Sólo afecta a personal en riesgo reproductivo: administrar con guante simple, no fraccionar ni triturar.
ACITRETINA	NEOTIGASON 25 MG CAP	3	No necesita preparación. No se precisa protección salvo que el manipulador esté en situación de riesgo reproductivo que, si tiene que fraccionar, debe hacerlo en CSB I con doble guante, bata y mascarilla, y contactar con SPRL.	Sólo afecta a personal en riesgo reproductivo: administrar con guante simple, no fraccionar ni triturar.
ROTIGOTINA	NEUPRO 2 MG PARCHES	3	No precisa preparación.	Sólo afecta a personal en riesgo reproductivo: Administrar con guante simple.
ROTIGOTINA	NEUPRO 8 MG PARCHES	3	No precisa preparación.	Sólo afecta a personal en riesgo reproductivo: Administrar con guante simple.
NEVIRAPINA	NEVIRAPINA 200 MG COMP	2	No precisa preparación.	Administrar con guante simple. Si es necesario fraccionar o triturar, utilizar la suspensión oral .

PRINCIPIO ACTIVO	ESPECIALIDAD	CLASIFICACION NIOSH	PRECAUCIONES PREPARACIÓN	PRECAUCIONES DE ADMINISTRACIÓN
NEVIRAPINA	VIRAMUNE 50 MG/ML SUSP	2	No precisa. Si hay que preparar dosis unitarias hacerlo en CSB I con doble guante, bata y mascarilla.	Administrar con doble guante y bata; utilizar protección ocular cuando exista riesgo de salpicadura y respiratoria si hay posibilidad de inhalación.
NILOTINIB	TASIGNA 150 MG CAP	1	No precisa. Si hay que dispersar en agua hacerlo con doble guante, bata y mascarilla.	Administrar con guante simple. Si hay que dispersar en agua hacerlo con doble guante, bata y mascarilla.
NILOTINIB	TASIGNA 250 MG CAP	1	No precisa. Si hay que dispersar en agua hacerlo con doble guante, bata y mascarilla.	Administrar con guante simple. Si hay que dispersar en agua hacerlo con doble guante, bata y mascarilla.
NINTEDANIB	OFEV 100 MG CAPS	1	No precisa. Si hay que dispersar en agua hacerlo con doble guante, bata y mascarilla.	Administrar con guante simple. Si hay que dispersar en agua hacerlo con doble guante, bata y mascarilla.
NINTEDANIB	VARGATEF 100 MG CAPS	1	No precisa. Si hay que dispersar en agua hacerlo con doble guante, bata y mascarilla.	Administrar con guante simple. Si hay que dispersar en agua hacerlo con doble guante, bata y mascarilla.
NINTEDANIB	OFEV 150 MG CAPS	1	No precisa. Si hay que dispersar en agua hacerlo con doble guante, bata y mascarilla.	Administrar con guante simple. Si hay que dispersar en agua hacerlo con doble guante, bata y mascarilla.
NINTEDANIB	VARGATEF 150 MG CAPS	1	No precisa. Si hay que dispersar en agua hacerlo con doble guante, bata y mascarilla.	Administrar con guante simple. Si hay que dispersar en agua hacerlo con doble guante, bata y mascarilla.
PENTOSTATINA	NIPENT 10 MG	1	Preparar en CSB IIB o AE, con doble guante, bata y mascarilla. Utilizar SCTM. Dispensar con el equipo de administración purgado.	Administrar con doble guante y bata; utilizar protección ocular cuando exista riesgo de salpicadura y respiratoria si hay posibilidad de inhalación.
MITOXANTRONA	NOVANTRONE 20 MG VIAL 10 ML	1	Preparar en CSB IIB o AE, con doble guante, bata y mascarilla. Utilizar SCTM. Dispensar con el equipo de administración purgado.	Administrar con doble guante y bata; utilizar protección ocular cuando exista riesgo de salpicadura y respiratoria si hay posibilidad de inhalación.

PRINCIPIO ACTIVO	ESPECIALIDAD	CLASIFICACION NIOSH	PRECAUCIONES PREPARACIÓN	PRECAUCIONES DE ADMINISTRACIÓN
BCG	ONCOTICE POLVO 2 ML	1	Preparar en CSB II o AE, con doble guante y bata y mascarilla. Utilizar SCTM. Dispensar con el equipo de administración purgado. No preparar en áreas en las que se preparan medicamentos parenterales para	Administrar con doble guante, bata, protección ocular y respiratoria.
OXALIPLATINO	OXALIPLATINO 200 MG VIAL 40 ML	1	Preparar en CSB IIB o AE, con doble guante, bata y mascarilla. Utilizar SCTM. Dispensar con el equipo de administración purgado.	Administrar con doble guante y bata; utilizar protección ocular cuando exista riesgo de salpicadura y respiratoria si hay posibilidad de inhalación.
OXCARBAZEPINA	OXCARBAZEPINA 300 MG COMP	2	No precisa preparación.	Administrar con guante simple. Si es necesario fraccionar o triturar, utilizar la suspensión oral.
OXCARBAZEPINA	TRILEPTAL 300 MG/5ML SUSP	2	Preparar en CSB I con doble guante, bata y mascarilla.	Administrar con doble guante y bata; utilizar protección ocular cuando exista riesgo de salpicadura y respiratoria si hay posibilidad de inhalación.
OXCARBAZEPINA	OXCARBAZEPINA 600 MG COMP	2	No precisa preparación.	Administrar con guante simple. Si es necesario fraccionar o triturar, utilizar la suspensión oral.
OXITOCINA	OXITOCINA 10 UI AMP 1ML	3	No se precisa protección salvo que el manipulador esté en situación de riesgo reproductivo, en cuyo caso debe contactar con el SPRL.	Sólo afecta a personal en riesgo reproductivo. No abrir las ampollas. Administrar con doble guante y bata; utilizar protección ocular cuando exista riesgo de salpicadura y respiratoria si hay posibilidad de inhalación. Contactar con SPRL.
PACLITAXEL	PACLITAXEL 300 MG VIAL 50 ML	1	Preparar en CSB IIB o AE, con doble guante, bata y mascarilla. Utilizar SCTM. Dispensar con el equipo de administración purgado.	Administrar con doble guante y bata; utilizar protección ocular cuando exista riesgo de salpicadura y respiratoria si hay posibilidad de inhalación.

PRINCIPIO ACTIVO	ESPECIALIDAD	CLASIFICACION NIOSH	PRECAUCIONES PREPARACIÓN	PRECAUCIONES DE ADMINISTRACIÓN
PAMIDRONICO ACIDO	PAMIDRONICO ACIDO 30 MG VIAL	3	No se precisa protección salvo que el manipulador esté en situación de riesgo reproductivo, en cuyo caso debe contactar con SPRL.	Sólo afecta a personal en riesgo reproductivo: no preparar los viales. Administrar con doble guante y bata; utilizar protección ocular cuando exista riesgo de salpicadura y respiratoria si hay posibilidad de inhalación.
PAROXETINA	PAROXETINA 20 MG COMP	3	No precisa preparación.	Sólo afecta a personal en riesgo reproductivo: administrar con guante simple, no fraccionar ni triturar. Si es necesario fraccionar o triturar, utilizar la suspensión oral.
PAZOPANIB	PAZOPANIB 400 MG COMP	1	No precisa.	Si hay que fraccionar o triturar hacerlo en CSB I con doble guante, bata y mascarilla. Administrar con guante simple
PAZOPANIB	PAZOPANIB 200 MG COMP	1	No precisa. Si hay que fraccionar o triturar hacerlo en CSB I con doble guante, bata y mascarilla.	Administrar con guante simple
PERTUZUMAB	PERJETA 420 VIAL 14 ML	1	Preparar en CSB Iib o AE, con doble guante, bata y mascarilla. Utilizar SCTM. Dispensar con el equipo de administración purgado.	Administrar con doble guante y bata; utilizar protección ocular cuando exista riesgo de salpicadura y respiratoria si hay posibilidad de inhalación.
PIXANTRONA	PIXIRUVI 29 MG VIAL	1	Preparar en CSB Iib o AE, con doble guante, bata y mascarilla. Utilizar SCTM. Dispensar con el equipo de administración purgado.	Administrar con doble guante y bata; utilizar protección ocular cuando exista riesgo de salpicadura y respiratoria si hay posibilidad de inhalación.
POLATUZUMAB	POLATUZUMAB 140 MG VIAL	1	Preparar en CSB Iib o AE, con doble guante, bata y mascarilla. Utilizar SCTM. Dispensar con el equipo de administración purgado.	Administrar con doble guante y bata; utilizar protección ocular cuando exista riesgo de salpicadura y respiratoria si hay posibilidad de inhalación.
POMALIDOMIDA	POMALIDOMIDA 3 MG CAP	1	No precisa. Si hay que fraccionar o triturar hacerlo en CSB I con doble guante, bata y mascarilla.	Administrar con guante simple.

PRINCIPIO ACTIVO	ESPECIALIDAD	CLASIFICACION NIOSH	PRECAUCIONES PREPARACIÓN	PRECAUCIONES DE ADMINISTRACIÓN
POMALIDOMIDA	POMALIDOMIDA 4 MG CAP	1	No precisa. Si hay que fraccionar o triturar hacerlo en CSB I con doble guante, bata y mascarilla.	Administrar con guante simple.
PROGESTERONA	UTROGESTAN 200 MG CAP	2	No precisa. Si hay que fraccionar o triturar hacerlo en CSB I con doble guante, bata y mascarilla.	Administrar con guante simple.
DINOPROSTONA	PROSTAGLANDINA E2 5 MG AMP 0,5 ML	3	No necesita preparación. No se precisa protección salvo que el manipulador esté en situación de riesgo reproductivo que, si tiene que fraccionar, debe hacerlo en CSB I con doble guante, bata y mascarilla, y contactar con SPRL.	Sólo afecta a personal en riesgo reproductivo: administrar con guante simple, no fraccionar ni triturar.
RASAGILINA	AZILECT 1 MG COMP	2	No precisa. Si hay que fraccionar o triturar hacerlo en CSB I con doble guante, bata y mascarilla.	Administrar con guante simple.
REGORAFENIB	STIVARGA 40 MG COMP	1	No precisa. Si hay que fraccionar o triturar hacerlo en CSB I con doble guante, bata y mascarilla.	Administrar con guante simple.
RIOCIGUAT	ADEMPAS 1 MG COMP	3	No necesita preparación. No se precisa protección salvo que el manipulador esté en situación de riesgo reproductivo que, si tiene que fraccionar, debe hacerlo en CSB I con doble guante, bata y mascarilla, y contactar con SPRL.	Sólo afecta a personal en riesgo reproductivo: administrar con guante simple, no fraccionar ni triturar.
RIOCIGUAT	ADEMPAS 1,5 MG COMP	3	No necesita preparación. No se precisa protección salvo que el manipulador esté en situación de riesgo reproductivo que, si tiene que fraccionar, debe hacerlo en CSB I con doble guante, bata y mascarilla, y contactar con SPRL.	Sólo afecta a personal en riesgo reproductivo: administrar con guante simple, no fraccionar ni triturar.

PRINCIPIO ACTIVO	ESPECIALIDAD	CLASIFICACION NIOSH	PRECAUCIONES PREPARACIÓN	PRECAUCIONES DE ADMINISTRACIÓN
RIOCIGUAT	ADEMPAS 2 MG COMP	3	No necesita preparación. No se precisa protección salvo que el manipulador esté en situación de riesgo reproductivo que, si tiene que fraccionar, debe hacerlo en CSB I con doble guante, bata y mascarilla, y <u>contactar con SPRL.</u>	Sólo afecta a personal en riesgo reproductivo: administrar con guante simple, no fraccionar ni triturar.
RIOCIGUAT	ADEMPAS 2,5 MG COMP	3	No necesita preparación. No se precisa protección salvo que el manipulador esté en situación de riesgo reproductivo que, si tiene que fraccionar, debe hacerlo en CSB I con doble guante, bata y mascarilla, y <u>contactar con SPRL.</u>	Sólo afecta a personal en riesgo reproductivo: administrar con guante simple, no fraccionar ni triturar.
SIROLIMUS	RAPAMUNE 0,5 MG COMP	2	No precisa preparación.	Administrar con guante simple. Si es necesario fraccionar o triturar, utilizar la <u>suspensión oral</u> .
SIROLIMUS	RAPAMUNE 2 MG COMP	2	No precisa preparación.	Administrar con guante simple. Si es necesario fraccionar o triturar, utilizar la <u>suspensión oral</u> .
SIROLIMUS	RAPAMUNE 1 MG COMP	2	No precisa preparación.	Administrar con guante simple. Si es necesario fraccionar o triturar, utilizar la <u>suspensión oral</u> .
SIROLIMUS	RAPAMUNE 60 MG SOL 60 ML	2	No precisa. Si hay que preparar dosis unitarias hacerlo en CSB I con doble guante, bata y mascarilla.	Administrar con doble guante y bata; utilizar protección ocular cuando exista riesgo de salpicadura y respiratoria si hay posibilidad de <u>inhalación</u> .
SORAFENIB	NEXAVAR 200 MG COMP	1	No precisa. Si hay que fraccionar o triturar hacerlo en CSB I con doble guante, bata y <u>mascarilla.</u>	Administrar con guante simple.
SUNITINIB	SUTENT 12,5 MG CAPS	1	No precisa. Si hay que fraccionar o triturar hacerlo en CSB I con doble guante, bata y <u>mascarilla.</u>	Administrar con guante simple.

PRINCIPIO ACTIVO	ESPECIALIDAD	CLASIFICACION NIOSH	PRECAUCIONES PREPARACIÓN	PRECAUCIONES DE ADMINISTRACIÓN
SUNITINIB	SUTENT 25 MG CAPS	1	No precisa. Si hay que fraccionar o triturar hacerlo en CSB I con doble guante, bata y mascarilla.	Administrar con guante simple.
SUNITINIB	SUTENT 50 MG CAPS	1	No precisa. Si hay que fraccionar o triturar hacerlo en CSB I con doble guante, bata y mascarilla.	Administrar con guante simple.
TACROLIMUS	ENVARUSUS 0,75 MG COMP	2	No precisa preparación.	Administrar con guante simple.
TACROLIMUS	ENVARUSUS 1 MG COMP	2	No precisa preparación.	Administrar con guante simple.
TACROLIMUS	ENVARUSUS 4 MG COMP	2	No precisa preparación.	Administrar con guante simple.
TACROLIMUS	PROGRAF 0,5 MG CAP	2	No precisa preparación.	Administrar con guante simple. Si es necesario fraccionar o triturar, utilizar la suspensión oral Fórmula Magistral.
TACROLIMUS	PROGRAF 1 MG CAP	2	No precisa preparación.	Administrar con guante simple. Si es necesario fraccionar o triturar, utilizar la suspensión oral Fórmula Magistral.
TACROLIMUS	TACROLIMUS 2 MG SUPOSITORIO	2	No precisa preparación.	Administrar con guante simple.
TACROLIMUS	PROGRAF 5 MG AMP 1 ML	2	Abrir y manipular la ampolla en CSB IIB o AE, con doble guante, bata y mascarilla. Utilizar SCTM en los procesos que sea posible. Dispensar con el equipo de administración purgado.	Administrar con doble guante y bata; utilizar protección ocular cuando exista riesgo de salpicadura y respiratoria si hay posibilidad de inhalación.
TACROLIMUS	PROGRAF 5 MG CAP	2	No precisa preparación.	Administrar con guante simple. Si es necesario fraccionar o triturar, utilizar la suspensión oral Fórmula Magistral.
TACROLIMUS	ADVAGRAF LIBERACION PROLONGADA 0.5 MG	2	No precisa preparación.	Administrar con guante simple.
TACROLIMUS	ADVAGRAF LIBERACION PROLONGADA 1 MG	2	No precisa preparación.	Administrar con guante simple.
TACROLIMUS	ADVAGRAF LIBERACION PROLONGADA 3 MG	2	No precisa preparación.	Administrar con guante simple.
TACROLIMUS	ADVAGRAF LIBERACION PROLONGADA 5 MG	2	No precisa preparación.	Administrar con guante simple.

PRINCIPIO ACTIVO	ESPECIALIDAD	CLASIFICACION NIOSH	PRECAUCIONES PREPARACIÓN	PRECAUCIONES DE ADMINISTRACIÓN
TAMOXIFENO	TAMOXIFENO 20 MG COMP	1	No precisa. Si hay que fraccionar o triturar hacerlo en CSB I con doble guante, bata y mascarilla.	Administrar con guante simple.
ATEZOLIZUMAB	TECENTRIQ 12 MG VIAL 20 ML	1	Preparar en CSB IIB o AE, con doble guante, bata y mascarilla. Utilizar SCTM. Dispensar con el equipo de administración purgado.	Administrar con doble guante y bata; utilizar protección ocular cuando exista riesgo de salpicadura y respiratoria si hay posibilidad de inhalación.
TEMOZOLOMIDA	TEMOZOLOMIDA 20 MG CAPS	1	No precisa preparación.	Administrar con guante simple. Si es necesario fraccionar o triturar, utilizar la suspensión oral Fórmula Magistral.
TEMOZOLOMIDA	TEMOZOLOMIDA 100 MG CAPS	1	No precisa preparación.	Administrar con guante simple. Si es necesario fraccionar o triturar, utilizar la suspensión oral Fórmula Magistral.
TEMOZOLOMIDA	TEMOZOLOMIDA 140 MG CAPS	1	No precisa preparación.	Administrar con guante simple. Si es necesario fraccionar o triturar, utilizar la suspensión oral Fórmula Magistral.
TEMOZOLOMIDA	TEMOZOLOMIDA 180 MG CAPS	1	No precisa preparación.	Administrar con guante simple. Si es necesario fraccionar o triturar, utilizar la suspensión oral Fórmula Magistral.
TEMOZOLOMIDA	TEMOZOLOMIDA 5 MG CAPS	1	No precisa preparación.	Administrar con guante simple. Si es necesario fraccionar o triturar, utilizar la suspensión oral Fórmula Magistral.
TERIFLUNOMIDA	AUBAGIO 14 MG COMP	2	No necesita preparación. No se precisa protección salvo que el manipulador esté en situación de riesgo reproductivo que, si tiene que fraccionar, debe hacerlo en CSB I con doble guante, bata y mascarilla, y contactar con SPRL.	Sólo afecta a personal en riesgo reproductivo: administrar con guante simple, no fraccionar ni triturar.
TIOGUANINA	LANVIS 40 MG COMP	1	No precisa. Si hay que fraccionar o triturar hacerlo en CSB I con doble guante, bata y mascarilla.	Administrar con guante simple.
TIVOZANIB	TIVOZANIB 13400 MGC CAP DURAS	1	No precisa preparación.	Administrar con guante simple.

PRINCIPIO ACTIVO	ESPECIALIDAD	CLASIFICACION NIOSH	PRECAUCIONES PREPARACIÓN	PRECAUCIONES DE ADMINISTRACIÓN
RALTITREXED	TOMUDEX 2 MG VIAL	1	Preparar en CSB IIB o AE, con doble guante, bata y mascarilla. Utilizar SCTM. Dispensar con el equipo de administración purgado.	Administrar con doble guante y bata; utilizar protección ocular cuando exista riesgo de salpicadura y respiratoria si hay posibilidad de inhalación
TOPIRAMATO	TOPIRAMATO 100 MG COMP	3	No precisa preparación.	Sólo afecta a personal en riesgo reproductivo: administrar con guante simple, no fraccionar ni triturar. Si es necesario fraccionar o triturar, utilizar la cápsula dispersable
TOPIRAMATO	TOPIRAMATO 200 MG COMP	3	No precisa preparación.	Sólo afecta a personal en riesgo reproductivo: administrar con guante simple, no fraccionar ni triturar. Si es necesario fraccionar o triturar, utilizar la cápsula dispersable
TOPIRAMATO	TOPIRAMATO 25 MG COMP	3	No precisa preparación.	Sólo afecta a personal en riesgo reproductivo: administrar con guante simple, no fraccionar ni triturar. Si es necesario fraccionar o triturar, utilizar la cápsula dispersable
TOPIRAMATO	TOPIRAMATO 50 MG COMP	3	No precisa preparación.	Sólo afecta a personal en riesgo reproductivo: administrar con guante simple, no fraccionar ni triturar. Si es necesario fraccionar o triturar, utilizar la cápsula dispersable
TRIFLURIDINA/TIPIRACIL	LONSURF 15/6,14 MG COMP REC	1	No precisa. Si hay que fraccionar o triturar hacerlo en CSB I con doble guante, bata y mascarilla.	Administrar con guante simple. Si hay que fraccionar o triturar ver Preparación.
TRIFLURIDINA/TIPIRACIL	LONSURF 20/8,19 MG COMP REC	1	No precisa. Si hay que fraccionar o triturar hacerlo en CSB I con doble guante, bata y mascarilla.	Administrar con guante simple. Si hay que fraccionar o triturar ver Preparación.

PRINCIPIO ACTIVO	ESPECIALIDAD	CLASIFICACION NIOSH	PRECAUCIONES PREPARACIÓN	PRECAUCIONES DE ADMINISTRACIÓN
TRIPTORELINA	DECAPEPTYL MENSUAL 3,75 MG JER 2 ML	1	Preparar en CSB IIB o AE, con doble guante, bata y mascarilla. Si no fuera posible preparar en cabina, utilizar doble guante, bata, protección ocular y respiratoria.	Administrar con doble guante y bata; utilizar protección ocular cuando exista riesgo de salpicadura y respiratoria si hay posibilidad de inhalación.
ABACAVIR/LAMIVUDINA/ZIDOVUDINA	TRIZIVIR 300/150/300 MG COMP	2	No precisa. Si hay que fraccionar o triturar hacerlo en CSB I con doble guante, bata y mascarilla.	Administrar con guante simple.
IFOSFAMIDA	TRONOXAL 1G VIAL	1	Preparar en CSB IIB o AE, con doble guante, bata y mascarilla. Utilizar SCTM. Dispensar con el equipo de administración purgado.	Administrar con doble guante y bata; utilizar protección ocular cuando exista riesgo de salpicadura y respiratoria si hay posibilidad de inhalación.
VALGANCICLOVIR	VALGANCICLOVIR 450 MG COMP	2	No precisa preparación	Administrar con guante simple. Si es necesario fraccionar o triturar, utilizar la suspensión oral .
VALGANCICLOVIR	VALGANCICLOVIR 50 MG/ML JARABE	2	Preparar en CSB I con doble guante, bata y mascarilla.	Administrar con doble guante y bata; utilizar protección ocular cuando exista riesgo de salpicadura y respiratoria si hay posibilidad de inhalación.
VALPROICO ACIDO	DEPAKINE 200 MG COMP	3	No precisa preparación.	Sólo afecta a personal en riesgo reproductivo: administrar con guante simple, no fraccionar ni triturar. Si es necesario fraccionar o triturar, utilizar la suspensión oral.
VALPROICO ACIDO	DEPAKINE 200MG/ML 40 ML	3	No necesita preparación. No se precisa protección salvo que el manipulador esté en situación de riesgo reproductivo que, si tiene que preparar dosis unitarias, debe hacerlo en CSB I con doble guante, bata y mascarilla. y contactar con SPRL.	Sólo afecta a personal en riesgo reproductivo: administrar con doble guante y bata; utilizar protección ocular cuando exista riesgo de salpicadura y respiratoria si hay posibilidad de inhalación.

PRINCIPIO ACTIVO	ESPECIALIDAD	CLASIFICACION NIOSH	PRECAUCIONES PREPARACIÓN	PRECAUCIONES DE ADMINISTRACIÓN
VALPROICO ACIDO	DEPAKINE CRONO 300 MG COMP	3	No precisa preparación.	Sólo afecta a personal en riesgo reproductivo: administrar con guante simple, no fraccionar ni triturar. Si es necesario fraccionar o triturar, utilizar la suspensión oral.
VALPROICO ACIDO	VALPROICO ACIDO 400 MG AMP 4 ML	3	No se precisa protección salvo que el manipulador esté en situación de riesgo reproductivo, en cuyo caso debe contactar con SPRL.	Sólo afecta a personal en riesgo reproductivo: no preparar los viales. Administrar con doble guante y bata; utilizar protección ocular cuando exista riesgo de salpicadura y respiratoria si hay posibilidad de inhalación.
VALPROICO ACIDO	DEPAKINE 500 MG COMP	3	No precisa preparación.	Sólo afecta a personal en riesgo reproductivo: administrar con guante simple, no fraccionar ni triturar. Si es necesario fraccionar o triturar, utilizar la suspensión oral.
VALPROICO ACIDO	DEPAKINE CRONO 500 MG COMP	3	No precisa preparación.	Sólo afecta a personal en riesgo reproductivo: administrar con guante simple, no fraccionar ni triturar. Si es necesario fraccionar o triturar, utilizar la suspensión oral.
VANDETANIB	CAPRELSA 100 MG COMP REC	1	No precisa. Si hay que dispersar en agua hacerlo con doble guante, bata y mascarilla.	Administrar con guante simple. Si hay que dispersar en agua hacerlo con doble guante, bata y mascarilla.
VANDETANIB	CAPRELSA 300 MG COMP REC	1	No precisa. Si hay que dispersar en agua hacerlo con doble guante, bata y mascarilla.	Administrar con guante simple. Si hay que dispersar en agua hacerlo con doble guante, bata y mascarilla.
PANITUMUMAB	VECTIBIX 100 MG VIAL 5 ML	1	Preparar en CSB IIB o AE, con doble guante, bata y mascarilla. Utilizar SCTM. Dispensar con el equipo de administración purgado.	Administrar con doble guante y bata; utilizar protección ocular cuando exista riesgo de salpicadura y respiratoria si hay posibilidad de inhalación.

PRINCIPIO ACTIVO	ESPECIALIDAD	CLASIFICACION NIOSH	PRECAUCIONES PREPARACIÓN	PRECAUCIONES DE ADMINISTRACIÓN
PANITUMUMAB	VECTIBIX 400 MG VIAL 20 ML	1	Preparar en CSB IIB o AE, con doble guante, bata y mascarilla. Utilizar SCTM. Dispensar con el equipo de administración urgado.	Administrar con doble guante y bata; utilizar protección ocular cuando exista riesgo de salpicadura y respiratoria si hay posibilidad de inhalación.
VEMURAFENIB	ZELBORAF 240 MG COMP	1	No precisa. Si hay que fraccionar o triturar hacerlo en CSB I con doble guante, bata y mascarilla.	Administrar con guante simple.
VENETOCLAX	VENCLYXTO 10 MG COMP	1	No precisa. Si hay que fraccionar o triturar hacerlo en CSB I con doble guante, bata y mascarilla.	Administrar con guante simple.
VENETOCLAX	VENCLYXTO 100 MG COMP	1	No precisa. Si hay que fraccionar o triturar hacerlo en CSB I con doble guante, bata y mascarilla.	Administrar con guante simple.
VENETOCLAX	VENCLYXTO 50 MG COMP	1	No precisa. Si hay que fraccionar o triturar hacerlo en CSB I con doble guante, bata y mascarilla.	Administrar con guante simple.
ETOPOSIDO	VEPESID 50 MG CAP	1	No precisa preparación.	Administrar con guante simple. Si es necesario fraccionar o triturar, utilizar la suspensión oral Fórmula Magistral.
TRETINOINA	VESANOID 10 MG CAPS BLANDAS	1	No precisa preparación.	Administrar con guante simple. Si es necesario fraccionar o triturar, utilizar la suspensión oral Fórmula Magistral.
VIGABATRINA	VIGABATRINA 500 MG SOBRES	3	No necesita preparación. No se precisa protección salvo que el manipulador esté en situación de riesgo reproductivo que, si tiene que fraccionar, debe hacerlo en CSB I con doble guante, bata y mascarilla, y contactar con SPRL.	Sólo afecta a personal en riesgo reproductivo: administrar con guante simple, no fraccionar ni triturar.
VINBLASTINA	VINBLASTINA 10 MG VIAL	1	Preparar en CSB IIB o AE, con doble guante, bata y mascarilla. Utilizar SCTM. Dispensar con el equipo de administración urgado.	Administrar con doble guante y bata; utilizar protección ocular cuando exista riesgo de salpicadura y respiratoria si hay posibilidad de inhalación.

PRINCIPIO ACTIVO	ESPECIALIDAD	CLASIFICACION NIOSH	PRECAUCIONES PREPARACIÓN	PRECAUCIONES DE ADMINISTRACIÓN
VINCRISTINA	VINCRISTINA 2 MG VIAL 2 ML	1	Preparar en CSB Iib o AE, con doble guante, bata y mascarilla. Utilizar SCTM. Dispensar con el equipo de administración purgado.	Administrar con doble guante y bata; utilizar protección ocular cuando exista riesgo de salpicadura y respiratoria si hay posibilidad de inhalación.
VINORELBINA	VINORELBINA 20 MG GLENMARKS CAPS	1	No precisa preparación.	Administrar con guante simple.
VINORELBINA	VINORELBINA 30 MG GLENMARKS CAPS	1	No precisa preparación.	Administrar con guante simple.
VINORELBINA	VINORELBINA 50 MG VIAL 5 ML (AUROVITAS)	1	Preparar en CSB Iib o AE, con doble guante, bata y mascarilla. Utilizar SCTM. Dispensar con el equipo de administración purgado	Administrar con doble guante y bata; utilizar protección ocular cuando exista riesgo de salpicadura y respiratoria si hay posibilidad de inhalación.
VORICONAZOL	VORICONAZOL 200 MG COMP	3	No precisa preparación.	Sólo afecta a personal en riesgo reproductivo: administrar con guante simple, no fraccionar ni triturar. Si es necesario fraccionar o triturar, utilizar la suspensión oral.
VORICONAZOL	VORICONAZOL 200 MG VIAL	3	No se precisa protección salvo que el manipulador esté en situación de riesgo reproductivo, en cuyo caso debe contactar con SPRL.	Sólo afecta a personal en riesgo reproductivo: no preparar los viales. Administrar con doble guante y bata; utilizar protección ocular cuando exista riesgo de salpicadura y respiratoria si hay posibilidad de inhalación.
VORICONAZOL	VORICONAZOL 40 MG/ML SUSPENSIÓN ORAL	3	No se precisa protección salvo que el manipulador esté en situación de riesgo reproductivo, en cuyo caso debe hacerlo en CSB I con doble guante, bata y mascarilla y contactar con SPRL.	Sólo afecta a personal en riesgo reproductivo: administrar con doble guante y bata; utilizar protección ocular cuando exista riesgo de salpicadura y respiratoria si hay posibilidad de inhalación.
VORICONAZOL	VORICONAZOL 50 MG COMP	3	No precisa preparación.	Sólo afecta a personal en riesgo reproductivo: administrar con guante simple, no fraccionar ni triturar. Si es necesario fraccionar o triturar, utilizar la suspensión oral.

PRINCIPIO ACTIVO	ESPECIALIDAD	CLASIFICACION NIOSH	PRECAUCIONES PREPARACIÓN	PRECAUCIONES DE ADMINISTRACIÓN
ESLICARBAZEPINA	ZEBINIX 800 MG COMP	3	No necesita preparación. No se precisa protección salvo que el manipulador esté en situación de riesgo reproductivo que, si tiene que fraccionar, debe hacerlo en CSB I con doble guante, bata y mascarilla, y contactar con SPRL.	Sólo afecta a personal en riesgo reproductivo: administrar con guante simple, no fraccionar ni triturar.
ABACAVIR	ZIAGEN 300 MG COMP	2	No precisa preparación.	Administrar con guante simple. Si es necesario fraccionar o triturar, utilizar la suspensión oral .
ZIDOVUDINA	ZIDOVUDINA 2MG/ML VIAL 100 ML	2	Añadir a la perfusión el equipo de administración purgado en CSB IIB o AE, con doble guante, bata y mascarilla. Utilizar SCTM. Dispensar con el equipo de administración purgado.	Administrar con doble guante y bata; utilizar protección ocular cuando exista riesgo de salpicadura y respiratoria si hay posibilidad de inhalación.
ZIDOVUDINA	ZIDOVUDINA 50MG/5ML SOLUCIÓN ORAL	2	No precisa. Si hay que preparar dosis unitarias hacerlo en CSB I con doble guante, bata y mascarilla.	Administrar con doble guante y bata; utilizar protección ocular cuando exista riesgo de salpicadura y respiratoria si hay posibilidad de inhalación.
ZIPRASIDONA	ZELDOX 20 MG CAPS	3	No necesita preparación. No se precisa protección salvo que el manipulador esté en situación de riesgo reproductivo que, si tiene que fraccionar, debe hacerlo en CSB I con doble guante, bata y mascarilla, y contactar con SPRL.	Sólo afecta a personal en riesgo reproductivo: administrar con guante simple, no fraccionar ni triturar.
ZIPRASIDONA	ZELDOX 40 MG CAPS	3	No necesita preparación. No se precisa protección salvo que el manipulador esté en situación de riesgo reproductivo que, si tiene que fraccionar, debe hacerlo en CSB I con doble guante, bata y mascarilla, y contactar con SPRL.	Sólo afecta a personal en riesgo reproductivo: administrar con guante simple, no fraccionar ni triturar.

PRINCIPIO ACTIVO	ESPECIALIDAD	CLASIFICACION NIOSH	PRECAUCIONES PREPARACIÓN	PRECAUCIONES DE ADMINISTRACIÓN
ZIPRASIDONA	ZELDOX 60 MG CAPS	3	No necesita preparación. No se precisa protección salvo que el manipulador esté en situación de riesgo reproductivo que, si tiene que fraccionar, debe hacerlo en CSB I con doble guante, bata y mascarilla, y contactar con SPRL.	Sólo afecta a personal en riesgo reproductivo: administrar con guante simple, no fraccionar ni triturar.
ZIPRASIDONA	ZIPRASIDONA 80 MG CAPS	3	No necesita preparación. No se precisa protección salvo que el manipulador esté en situación de riesgo reproductivo que, si tiene que fraccionar, debe hacerlo en CSB I con doble guante, bata y mascarilla, y contactar con SPRL.	Sólo afecta a personal en riesgo reproductivo: administrar con guante simple, no fraccionar ni triturar.
ZOLEDRONICO ACIDO	ZOLEDRONICO ACIDO 4 MG BOLSA 100 ML	3	No se precisa protección salvo que el manipulador esté en situación de riesgo reproductivo, en cuyo caso debe contactar con el SPRL	Sólo afecta a personal en riesgo reproductivo: administrar con doble guante y bata; utilizar protección ocular cuando exista riesgo de salpicadura y respiratoria si hay posibilidad de inhalación.
ZOLEDRONICO ACIDO	ZOLEDRONICO ACIDO 5 MG BOLSA 100ML	3	No se precisa protección salvo que el manipulador esté en situación de riesgo reproductivo, en cuyo caso debe contactar con el SPRL.	Sólo afecta a personal en riesgo reproductivo: administrar con doble guante y bata; utilizar protección ocular cuando exista riesgo de salpicadura y respiratoria si hay posibilidad de inhalación.
ZONISAMIDA	ZONEGRAN 100 MG CAPS	3	No necesita preparación. No se precisa protección salvo que el manipulador esté en situación de riesgo reproductivo que, si tiene que fraccionar, debe hacerlo en CSB I con doble guante, bata y mascarilla, y contactar con SPRL.	Sólo afecta a personal en riesgo reproductivo: administrar con guante simple, no fraccionar ni triturar.

PRINCIPIO ACTIVO	ESPECIALIDAD	CLASIFICACION NIOSH	PRECAUCIONES PREPARACIÓN	PRECAUCIONES DE ADMINISTRACIÓN
ZONISAMIDA	ZONEGRAN 25 MG CAPS	3	No necesita preparación. No se precisa protección salvo que el manipulador esté en situación de riesgo reproductivo que, si tiene que fraccionar, debe hacerlo en CSB I con doble guante, bata y mascarilla, y contactar con SPRL.	Sólo afecta a personal en riesgo reproductivo: administrar con guante simple, no fraccionar ni triturar.
ZONISAMIDA	ZONEGRAN 50 MG CAPS	3	No necesita preparación. No se precisa protección salvo que el manipulador esté en situación de riesgo reproductivo que, si tiene que fraccionar, debe hacerlo en CSB I con doble guante, bata y mascarilla, y contactar con SPRL.	Sólo afecta a personal en riesgo reproductivo: administrar con guante simple, no fraccionar ni triturar.



GERENCIA
DE ATENCIÓN
INTEGRADA
DE ALBACETE

SERVICIO DE FARMACIA
MEDICAMENTOS PELIGROSOS INCLUIDOS EN GFT GAI ALBACETE

Fecha actualización. feb 2020

PRINCIPIO ACTIVO	ESPECIALIDAD	CLASIFICACION NIOSH	PRECAUCIONES PREPARACIÓN	PRECAUCIONES DE ADMINISTRACIÓN
------------------	--------------	------------------------	--------------------------	--------------------------------



GERENCIA
DE ATENCIÓN
INTEGRADA
DE ALBACETE

SERVICIO DE FARMACIA
MEDICAMENTOS PELIGROSOS INCLUIDOS EN GFT GAI ALBACETE

Fecha actualización. feb 2020

PRINCIPIO ACTIVO	ESPECIALIDAD	CLASIFICACION NIOSH	PRECAUCIONES PREPARACIÓN	PRECAUCIONES DE ADMINISTRACIÓN
------------------	--------------	------------------------	--------------------------	--------------------------------



GERENCIA
DE ATENCIÓN
INTEGRADA
DE ALBACETE

SERVICIO DE FARMACIA
MEDICAMENTOS PELIGROSOS INCLUIDOS EN GFT GAI ALBACETE

Fecha actualización. feb 2020

PRINCIPIO ACTIVO	ESPECIALIDAD	CLASIFICACION ACION NIOSH	PRECAUCIONES PREPARACIÓN	PRECAUCIONES DE ADMINISTRACIÓN
------------------	--------------	---------------------------------	--------------------------	--------------------------------



GERENCIA
DE ATENCIÓN
INTEGRADA
DE ALBACETE

SERVICIO DE FARMACIA
MEDICAMENTOS PELIGROSOS INCLUIDOS EN GFT GAI ALBACETE

Fecha actualización. feb 2020

PRINCIPIO ACTIVO	ESPECIALIDAD	CLASIFICACION ACION NIOSH	PRECAUCIONES PREPARACIÓN	PRECAUCIONES DE ADMINISTRACIÓN
-------------------------	---------------------	--	---------------------------------	---------------------------------------



GERENCIA
DE ATENCIÓN
INTEGRADA
DE ALBACETE

SERVICIO DE FARMACIA
MEDICAMENTOS PELIGROSOS INCLUIDOS EN GFT GAI ALBACETE

Fecha actualización. feb 2020

PRINCIPIO ACTIVO	ESPECIALIDAD	CLASIFICACION ACION NIOSH	PRECAUCIONES PREPARACIÓN	PRECAUCIONES DE ADMINISTRACIÓN
-------------------------	---------------------	--	---------------------------------	---------------------------------------



GERENCIA
DE ATENCIÓN
INTEGRADA
DE ALBACETE

SERVICIO DE FARMACIA
MEDICAMENTOS PELIGROSOS INCLUIDOS EN GFT GAI ALBACETE

Fecha actualización. feb 2020

PRINCIPIO ACTIVO	ESPECIALIDAD	CLASIFICACION ACION NIOSH	PRECAUCIONES PREPARACIÓN	PRECAUCIONES DE ADMINISTRACIÓN
-------------------------	---------------------	--	---------------------------------	---------------------------------------

PRINCIPIO ACTIVO	ESPECIALIDAD	CLASIFICACION NIOSH	PRECAUCIONES PREPARACIÓN	PRECAUCIONES DE ADMINISTRACIÓN
------------------	--------------	---------------------	--------------------------	--------------------------------

No coincide lo del hospi que
pone 3 y ifnomep pone 2

SERVICIO DE FARMACIA
MEDICAMENTOS PELIGROSOS INCLUIDOS EN GFT GAI ALBACETE

Fecha actualización. feb 2020

SERVICIO DE FARMACIA
MEDICAMENTOS PELIGROSOS INCLUIDOS EN GFT GAI ALBACETE

Fecha actualización. feb 2020

SERVICIO DE FARMACIA
MEDICAMENTOS PELIGROSOS INCLUIDOS EN GFT GAI ALBACETE

Fecha actualización. feb 2020

**SERVICIO DE FARMACIA
MEDICAMENTOS PELIGROSOS INCLUIDOS EN GFT GAI ALBACETE**

Fecha actualización. feb 2020

SERVICIO DE FARMACIA
MEDICAMENTOS PELIGROSOS INCLUIDOS EN GFT GAI ALBACETE

Fecha actualización. feb 2020

SERVICIO DE FARMACIA
MEDICAMENTOS PELIGROSOS INCLUIDOS EN GFT GAI ALBACETE

Fecha actualización. feb 2020

SERVICIO DE FARMACIA
MEDICAMENTOS PELIGROSOS INCLUIDOS EN GFT GAI ALBACETE

Fecha actualización. feb 2020

**SERVICIO DE FARMACIA
MEDICAMENTOS PELIGROSOS INCLUIDOS EN GFT GAI ALBACETE**

Fecha actualización. feb 2020

SERVICIO DE FARMACIA
MEDICAMENTOS PELIGROSOS INCLUIDOS EN GFT GAI ALBACETE

Fecha actualización. feb 2020

**SERVICIO DE FARMACIA
MEDICAMENTOS PELIGROSOS INCLUIDOS EN GFT GAI ALBACETE**

Fecha actualización. feb 2020

SERVICIO DE FARMACIA
MEDICAMENTOS PELIGROSOS INCLUIDOS EN GFT GAI ALBACETE

Fecha actualización. feb 2020

SERVICIO DE FARMACIA
MEDICAMENTOS PELIGROSOS INCLUIDOS EN GFT GAI ALBACETE

Fecha actualización. feb 2020

SERVICIO DE FARMACIA
MEDICAMENTOS PELIGROSOS INCLUIDOS EN GFT GAI ALBACETE

Fecha actualización. feb 2020

SERVICIO DE FARMACIA
MEDICAMENTOS PELIGROSOS INCLUIDOS EN GFT GAI ALBACETE

Fecha actualización. feb 2020

SERVICIO DE FARMACIA
MEDICAMENTOS PELIGROSOS INCLUIDOS EN GFT GAI ALBACETE

Fecha actualización. feb 2020

SERVICIO DE FARMACIA
MEDICAMENTOS PELIGROSOS INCLUIDOS EN GFT GAI ALBACETE

Fecha actualización. feb 2020

SERVICIO DE FARMACIA
MEDICAMENTOS PELIGROSOS INCLUIDOS EN GFT GAI ALBACETE

Fecha actualización. feb 2020

**SERVICIO DE FARMACIA
MEDICAMENTOS PELIGROSOS INCLUIDOS EN GFT GAI ALBACETE**

Fecha actualización. feb 2020

SERVICIO DE FARMACIA
MEDICAMENTOS PELIGROSOS INCLUIDOS EN GFT GAI ALBACETE

Fecha actualización. feb 2020

**SERVICIO DE FARMACIA
MEDICAMENTOS PELIGROSOS INCLUIDOS EN GFT GAI ALBACETE**

Fecha actualización. feb 2020

**SERVICIO DE FARMACIA
MEDICAMENTOS PELIGROSOS INCLUIDOS EN GFT GAI ALBACETE**

Fecha actualización. feb 2020

SERVICIO DE FARMACIA
MEDICAMENTOS PELIGROSOS INCLUIDOS EN GFT GAI ALBACETE

Fecha actualización. feb 2020

SERVICIO DE FARMACIA
MEDICAMENTOS PELIGROSOS INCLUIDOS EN GFT GAI ALBACETE


Fecha actualización. feb 2020

SERVICIO DE FARMACIA
MEDICAMENTOS PELIGROSOS INCLUIDOS EN GFT GAI ALBACETE

Fecha actualización. feb 2020

**SERVICIO DE FARMACIA
MEDICAMENTOS PELIGROSOS INCLUIDOS EN GFT GAI ALBACETE**

Fecha actualización. feb 2020



**SERVICIO DE FARMACIA
MEDICAMENTOS PELIGROSOS INCLUIDOS EN GFT GAI ALBACETE**

Fecha actualización. feb 2020

**SERVICIO DE FARMACIA
MEDICAMENTOS PELIGROSOS INCLUIDOS EN GFT GAI ALBACETE**

Fecha actualización. feb 2020

SERVICIO DE FARMACIA
MEDICAMENTOS PELIGROSOS INCLUIDOS EN GFT GAI ALBACETE

Fecha actualización. feb 2020

**SERVICIO DE FARMACIA
MEDICAMENTOS PELIGROSOS INCLUIDOS EN GFT GAI ALBACETE**

Fecha actualización. feb 2020

SERVICIO DE FARMACIA
MEDICAMENTOS PELIGROSOS INCLUIDOS EN GFT GAI ALBACETE

Fecha actualización. feb 2020

SERVICIO DE FARMACIA
MEDICAMENTOS PELIGROSOS INCLUIDOS EN GFT GAI ALBACETE

Fecha actualización. feb 2020

SERVICIO DE FARMACIA
MEDICAMENTOS PELIGROSOS INCLUIDOS EN GFT GAI ALBACETE

Fecha actualización. feb 2020

SERVICIO DE FARMACIA
MEDICAMENTOS PELIGROSOS INCLUIDOS EN GFT GAI ALBACETE

Fecha actualización. feb 2020

SERVICIO DE FARMACIA
MEDICAMENTOS PELIGROSOS INCLUIDOS EN GFT GAI ALBACETE

Fecha actualización. feb 2020

SERVICIO DE FARMACIA
MEDICAMENTOS PELIGROSOS INCLUIDOS EN GFT GAI ALBACETE

Fecha actualización. feb 2020

SERVICIO DE FARMACIA
MEDICAMENTOS PELIGROSOS INCLUIDOS EN GFT GAI ALBACETE

Fecha actualización. feb 2020

**SERVICIO DE FARMACIA
MEDICAMENTOS PELIGROSOS INCLUIDOS EN GFT GAI ALBACETE**

Fecha actualización. feb 2020

SERVICIO DE FARMACIA
MEDICAMENTOS PELIGROSOS INCLUIDOS EN GFT GAI ALBACETE

Fecha actualización. feb 2020

SERVICIO DE FARMACIA
MEDICAMENTOS PELIGROSOS INCLUIDOS EN GFT GAI ALBACETE

Fecha actualización. feb 2020

SERVICIO DE FARMACIA
MEDICAMENTOS PELIGROSOS INCLUIDOS EN GFT GAI ALBACETE

Fecha actualización. feb 2020

SERVICIO DE FARMACIA
MEDICAMENTOS PELIGROSOS INCLUIDOS EN GFT GAI ALBACETE

Fecha actualización. feb 2020

SERVICIO DE FARMACIA
MEDICAMENTOS PELIGROSOS INCLUIDOS EN GFT GAI ALBACETE

Fecha actualización. feb 2020

SERVICIO DE FARMACIA
MEDICAMENTOS PELIGROSOS INCLUIDOS EN GFT GAI ALBACETE

Fecha actualización. feb 2020