



COMPLEJO
HOSPITALARIO
UNIVERSITARIO
DE ALBACETE



Nº Hª CLINICA

Nº S.S.:

SERVICIO/SECCION:

Nº CAMA

CONSULTA EXT.

1º APELLIDO:

2º APELLIDO:

NOMBRE:

SEXO

EDAD

FECHA

SERVICIO DE RADIODIAGNÓSTICO

AUTORIZACIÓN PARA EXPLORACIONES RADIOLÓGICAS

D/Dña..... D.N.I. nº..... paciente / representante, autoriza / deniega (táchese lo que no proceda), al especialista designado por el Servicio de Radiodiagnóstico para que le realice el procedimiento marcado, habiendo leído la información de esta autorización y habiendo sido informado oralmente de su indicación, su necesidad, sus riesgos, así como de otras alternativas, y comprendido sus explicaciones:

Albacete, a de de Firma:

Nombre del Médico que informa:..... Firma:

ATENCIÓN: Muchas de las técnicas implican el uso de **CONTRASTE YODADO**. El contraste yodado puede provocar alguna **REACCIÓN**, que puede ir desde calor, náuseas, picores, hasta hipotensión, problemas respiratorios o cardíacos, o agravamiento de enfermedades previas, llegando incluso a la muerte en casos muy raros.

- 1. **Urografía intravenosa:** Consiste en la visualización de los riñones, los uréteres y la vejiga mediante la introducción de contraste intravenoso. Riesgos: Hematoma o extravasación de contraste en el punto de punción, **reacciones al contraste**. Preparación: Ayunas de 6 horas, enemas de limpieza intestinal.
- 2. **Uretrocistografía:** Consiste en la visualización de la vejiga y/o de la uretra introduciendo contraste a través de una sonda. Riesgos: Escozor, dolor, hemorragia. Preparación: Orinar antes.
- 3. **Tomografía Axial Computerizada:** Cuando se realiza un T.A.C. puede ser necesario administrar contraste intravenoso para visualizar mejor determinadas lesiones u órganos. Riesgos: Hematoma o extravasación de contraste en el punto de punción; **reacciones al contraste**. Preparación: Ayunas de 6 horas.
- 4. **Colangiografía por tubo de Kher:** Consiste en la introducción de contraste por el tubo de drenaje que se deja tras una intervención de vesícula para comprobar que el resultado ha sido satisfactorio. Riesgos: Dolor a veces.
- 5. **Fistulografía:** Consiste en la introducción de contraste por el orificio de una fístula cutánea para valorar su extensión y origen. Riesgos: Puede producir dolor. Preparación: La fístula debe estar abierta.

continúa.../...

DEBERÁ QUEDAR EN LA HISTORIA DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADA

.../... continuación

- 6. Histerosalpingografía:** Consiste en introducir contraste en útero y trompas a través de la vagina para valorar casos de esterilidad. Riesgos: Dolor, infección. Preparación: Ha de realizarse unos días después de terminar la regla absteniéndose de relaciones sexuales.
- 7. Dacriografía:** Consiste en la introducción de contraste radioopaco en el conducto lacrimal para valorar obstrucciones del mismo. Riesgos: Puede producir dolor. Preparación: Ninguna.
- 8. Sialografía:** Consiste en la introducción de contraste radioopaco en el conducto de una glándula salivar para valorar cálculos, obstrucciones, infecciones, etc. Riesgos: Puede producir dolor. Preparación: Ninguna.
- 9. Galactografía:** Consiste en la introducción de contraste radioopaco en los conductos de la glándula mamaria para su visualización en las mamografías. Riesgos: Puede producir dolor, o mastitis. Preparación: Ninguna.
- 10. Tránsito Esófago-Gastro-Duodenal:** Consiste en la visualización de la parte superior del tubo digestivo, esófago, estómago y duodeno, mediante la ingesta de un contraste líquido radioopaco. Riesgos: Aspiración pulmonar si hay problemas en la deglución, mediastinitis o peritonitis si hay alguna perforación. Preparación: Ayunas de 8 horas.
- 11. Tránsito Intestinal:** Consiste en la visualización del intestino delgado mediante la ingesta de un contraste líquido radioopaco. Puede hacerse sólo o junto con un Tránsito E-G-D. Riesgos: Aspiración pulmonar si hay problemas en la deglución, mediastinitis o peritonitis si hay alguna perforación. Preparación: Ayunas de 8 horas.
- 12. Enema Opaco:** Consiste en la visualización del intestino grueso (colon) mediante la administración de contraste líquido radioopaco por vía rectal a través de una cánula. Riesgos: Hemorragia si hay úlceras o varices (hemorroides) en el ano, peritonitis en caso de perforación o úlcera perforada. Preparación: Dieta pobre en residuos desde días antes, enemas de lavado (2 litros) el día antes y por la mañana.

RIESGOS PERSONALIZADOS:.....
.....
.....

REVOCACIÓN

Revoco el consentimiento para,
prestado en fecha,y no deseo proseguir el tratamiento, que doy con esta fecha por
finalizado.

En (LUGAR Y FECHA).

Fdo.: EL/LA MÉDICO,

Fdo.: EL/LA PACIENTE,