

Niña de 6 años que desde hace 1 mes y medio presenta una placa eritematosa, descamativa y pruriginosa en región infraorbicular izquierda. Debido a su antecedente de dermatitis atópica, fue tratada con corticoides tópicos sin gran mejoría. Afebril y buen estado general.

Antecedentes personales:

No reacciones alérgicas medicamentosas conocidas. No antecedentes médicos ni quirúrgicos de interés. Dermatitis atópica desde hace 1 año y medio. No antecedentes de enfermedades cutáneas previas personales ni familiares. No ingesta de fármacos habitualmente. Vive con perros y gatos.



Exploración física:

Inspección: Placa eritematosa, descamativa y ligeramente edematosa, con pequeñas pústulas y pseudovesículas en su interior de 3-4 centímetros en región infraorbicular izquierda.

Maniobras sugeridas: palpación: no infiltrado ni adherido a planos profundos. No se palpan adenopatías locoregionales

¿Qué diagnóstico diferencial plantearía?

¿Qué pruebas diagnósticas serían de ayuda a su diagnóstico?

□

Diagnóstico diferencial:

- Dermatitis atópica.

- Eccema numular.
- Dermatitis de contacto irritativa / alérgica.
- Psoriasis.
- Enfermedades autoinmunes.
- Impétigo.
- Micosis cutánea superficial.

Pruebas complementarias

- Exámen de las escamas, previo tratamiento con KOH, intentando identificar elementos fúngicos.
- Cultivo de las escamas en medios para dermatofitos. Permite la identificación del microorganismo implicado.

Caso facilitado por: Dra. Cristina Faura B. (MIR 3º Dermatología)