

TITULO: Reparación laparoscópica de la hernia diafragmática retroesternal de Morgagni.
AUTORES: González Piñera J, Fernández Córdoba MS, Hernández Anselmi E, Marijuán Sahuquillo V. SERVICIO DE CIRUGIA PEDIATRICA. Complejo Hospitalario Universitario de Albacete

La hernia diafragmática retroesternal (de Larrey o Morgagni) representa menos del 5% de las hernias diafragmáticas. Su reparación puede realizarse mediante sutura primaria, colocación de malla o una combinación de ambas técnicas, por cirugía abierta, laparoscópica o toracoscópica. Presentamos la corrección laparoscópica mediante puntos extracorpóreos transmurales en la pared anterior abdominal.

Niña que en revisión pediátrica se realiza hallazgo casual de tumoración torácica derecha. El TAC muestra una masa intratorácica anteromedial EN hemitórax derecho, de 113x76x61 mm, de contenido graso y comunicada con un orificio diafragmático, compatible con hernia diafragmática con grasa mesentérica en su interior. Realizamos laparoscopia con puerto umbilical de 10 mm para óptica y 2 puertos medioclaviculares de 3 mm, constatando hernia de Morgagni con eiplon en su interior. Practicamos el cierre diafragmático con 3 puntos en "U" que incluyen el espesor total de la pared abdominal anterior y el labio del defecto diafragmático, anudándolos extracorpóreamente sobre la aponeurosis de la pared abdominal dejando el nudo subcutáneo. Es dada de alta a las 48 horas asintomática.

Bibliografía

1. Azzie G, Maoate K, Beasley S, Retief W, Bensoussan A. A simple technique of laparoscopic full-thickness anterior abdominal wall repair of retrosternal (Morgagni) hernias. *J Pediatr Surg.* 2003 May;38(5):768-70.
2. Mallick MS, Alqahtani A. Laparoscopic-assisted repair of Morgagni hernia in children. *J Pediatr Surg.* 2009 Aug;44(8):1621-4.
3. Van De Winkel N, De Vogelaere K, De Backer A, Delvaux G. Laparoscopic repair of diaphragmatic Morgagni hernia in children: review of 3 cases. *J Pediatr Surg.* 2011 Feb;46(2):e23-6.